JANVIER 1905

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR LE

JARDIN ÇORREVON

(Jardin alpin d'Acclimatation)

Floraire — Chêne-Bourg, Genève

22me CATALOGUE DE GRAINES

Terrestria sidera flores.



Graines de plantes alpines . . . p. 1
» de plantes vivaces d'ornement 21
» d'arbres, d'arbustes de rocailles et pl. grimpantes. 28
» de cactées rustiques . . 30

Graines reçues d'Amérique, d'Australie, du Liban, du Japon, des Balkans, du Caucase, de l'Himalaya, de Nouvelle-Zélande, des Pyrénées, de Sibérie, du Sikkim, etc. 30

DU SEMIS

Il est reconnu que les plantes alpines qu'on acclimate par le moyen du semis sont plus florifères et beaucoup plus résistantes à nos climats. Tandis que le 6 % à peine des plantes qu'on arrache dans la nature parvient à fleurir et à se développer dans les jardins, celles élevées de graines réussissent admirablement. Le jardin alpin d'acclimatation, qui a été fondé dans le but d'aider les amateurs et de les pourvoir de graines ou de plantes élevées par semis, donne ici la liste des semences récoltées par lui.

Pour les bien réussir il importe d'observer les conditions suivantes: faire un terrain léger, sablonneux, juste assez nourrissant pour donner les éléments nécessaires à de toutes jeunes plantes. Nous le composons de: un tiers terre de bruyère (peat) ou terreau de feuilles, un tiers terre franche et un tiers de sable.

Le moment le plus favorable à cette opération est l'arrière automne, c'est-à-dire fin Novembre ou commencement de Décembre ou le printemps. Pourtant il est certaines espèces (Anémones du groupe Pulsatille, Edelweiss, Composées et en général les graines munies d'aigrettes et de plumes) qui lèvent mieux si on les sème de suite après leur maturité. Mais dans la grande majorité des cas c'est l'arrière automne ou le premier printemps qu'il faut choisir comme étant la meilleure époque pour les semis.

On sème dans des pots, terrines ou caissettes qu'on draine en remplissant le fond et jusqu'au tiers de leur hauteur, de briques ou de pierres ou bien encore de coke. Il faut avoir soin de très peu recouvrir les graines, surtout celles qui sont très fines. Certaines espèces même, telles que les Saxifragées, les Crassulacées, demandent à n'être pas du tout recouvertes. Ces pots seront placés sous une couche froide, le plus près possible du verre et dès qu'il tombera de la neige on aura soin de les recouvrir et d'en former un monceau le plus haut possible. On enlève alors les châssis qu'on remet en place lors de la fonte de la neige, ceci pour les semis d'automne.

Dans les pays où la neige fait défaut il est préférable de ne semer qu'en Mars-Avril. Si l'on attend en Mai-Juin pour le faire il serait bon d'ajouter à la composition du sol indiquée plus haut un peu de Sphagnum tamisé dont l'effet modérateur est très avantageux à la germination des graines. Les bonnes pluies chaudes du printemps sont extrêmement favorables à la germination et il faut, le plus possible, exposer les semis à cette action bienfaisante dont ils ne souffriront pas si les pots sont bien drainés.

On peut aussi semer en pleine terre, mais alors il faut avoir soin de surveiller les semis et d'empêcher les mauvaises herbes ou les insectes nuisibles de les détruire.

En général le semis est le même que celui des plantes annuelles ou vivaces les plus délicates; il n'offre aucune difficulté et réussit bien.

Les genres qui germent le plus rapidement sont les Cistinées, les Violariées, les Crucifères, les Papilionacées; puis viennent les Composées, les Ombellifères, les Saxifragées, les Crassulacées, etc., etc. Ce sont les Gentianées et les Primulacées qui mettent le plus de temps à germer avec certaines Renonculacées, les Berbéridées, etc.

La germination des graines est, au reste, une chose capricieuse. Il ne faut jamais détruire un semis qui n'a pas levé avant une année pour le moins.

Quand les graines ont germé, et que les plantules commencent à prendre un peu de consistance, c'est-à-dire qu'elles émettent la 2e et la 3e feuille au-dessus des cotylédons, il faut les repiquer, dans un terreau qui convienne à la nature de chacune d'elles. Lire à ce sujet notre volume, *Les plantes alpines et de rocaille.*

English correspondance. *Deutsche Correspondenz.*

Espèces montagnardes et de rochers

Seeds of alpine and mountain plants

Nous ne donnons pas ici la description des plantes parce que la plupart de nos clients possèdent le petit volume « Plantes alpines et de rocailles et leur culture » par H. Correvon et que, d'autre part, notre catalogue de plantes (1899) contient plusieurs de ces descriptions.

Toutes nos semences se vendent au prix de 50 centimes le paquet

Les personnes que le choix d'une collection embarrassent, peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines d'espèces montagnardes et vivaces aux prix suivants à *notre choix :*

12 espèces pour	5 francs
25 » »	10 »
50 » »	20 »
100 » »	40 »

Our seeds are sold to the price of 50 cts. (5 d.) each paquet.

We make collections to our own choice :

12 kinds for	5 francs	(4 sh.)
25 » »	10 »	(8 sh.)
50 » »	20 »	(16 sh.)
100 » »	40 »	(32 sh.)

Espèces montagnardes et de rochers.

Acæna microphylla.
» ovalifolia.
» ovina.
» pinnatifida.
» repens.
» sanguisorbæ.
» sarmentosa.
» sericea.
» trifida.

Charmantes pl. gazonnantes très propres à garnir les rocailles.

Acantholimon glumaceum.
» libanoticum.
» venustum.
Achillea argentea.
» atrata.
» Clavenæ.
» crustata.
» Gerberi.
» herba Rota.
» impatiens.
» Kretliana.
» lanulosa.
» lingulata.
» macrophylla.
» moschata.
» nana.
» ptarmica.
» pyrenaica.
» Reichardiana.
» serbica.
» sericea.
» setacea.
» speciosa.
» sudetica.
» taygetea.
» tomentosa.
» umbellata.
Aconitum album.
» anthora.
» cernuum.
» Columbianum.
» album.
» ferox.
» Fischeri.
» Kuznezowi.
» japonicum.
» lycoctonum.
» napellus.
» » à fl. blanches.
» paniculatum.
» pyrenaicum.
» septentrionale.
» uncinatum.
» variegatum.
Actæa spicata.
Adenostyles albifrons.
» alpina.
» leucophylla.
Adonis vernalis.
» pyrenaica.
» wolgensis.
Aethionema armenum.
» Cappedocica.
» cordatum.
» coridifolium.
» grandiflorum.
» iberideum.
» ovalifolium.
» persicum.
» saxatile.

Jolies pl. naines à fl. roses ; abondante floraison.

» Thomasianum.
Agrostis alpina.
» exarata.
» rupestris.
» stolonifera.
Ajuga pyramidalis.
» genevensis.
Alchemilla alpina.
» conjuncta.
» Lapeyrousei.
» pentaphyllea.
» pubescens.
» pyrenaica.
» splendens.
» vulgaris.
Alfredia cernua.
» nivea.
» stenolepis.
Allium moly.
» montanum.
» nigrum.
» Victoriale.
Alsine austriaca.
» bauhinorum.
» biflora.
» gerardi.
» juniperifolia.
» laricifolia.
» liniflora.
» pinifolia.
» recurva.
» verna.
Alyssum argenteum.
» calyocarpum.
» creticum.
» Heinzii.
» incanum.
» maritimum.
» Mœllendorfianum.
» montanum.
» orientale.
» petræum.
» Rochelii.
» rostratum.
» saxatile.
» serpyllifolium.
» speciosum.
» spinosum.

» Wiersbickii.
» Wulfenianum.
Amelanchier vulgaris.
Anarrhinum bellidifolium.
Andromeda polifolia.
Androsace carnea.
» chamæjasme.
» Charpentieri.
» ciliata.
» coronopifolia.
» cylindrica.
» elongata.
» glacialis.
» Hausmanni.
» Helvetica.
» imbricata.
» lactea.
» lactiflora.
» Laggeri.
» lanuginosa.
» obtusifolia.
» Pacheri.
» pubescens.
» sarmentosa.
» septentrionalis.
» villosa.
» vitaliana.
Andryala lanata. (Hieracium lanatum).
Anemone alpina.

C'est la grande et belle anémone à fl. blanches des régions alpines. On l'élève facilement de graines, mais celles-ci germent lentement.

» apennina.
» Baldensis.
» decapetala.
» dichotoma.
» globosa.
» Halleri.
» magellanica.
» montana.
» multifida.
» narcissiflora.

L'une des plus faciles à cultiver mais à germination lente; fl. roses en jolis bouquets dressés.

Anemone nemorosa, la jolie sylvie des bois.
» occidentalis.
» patens.
» pratensis.
» » var. nigricans.
» » var. obsoleta.
» pulsatilla.
» rivularis.
» rubra.
» sulfurea, la belle anémone soufrée des Alpes.
» sylvestris.

Grande fl. blanche à revers rose; pl. envahissante et de culture facile.

» vernalis.
» virginica.
Angelica ampla.
» Archangelica (Angélique).
» Gmelini.
» Pancicii.
» tomentosa.
Antennaria alpina.
» carpathica.
» dioica.
» monocephala.
» plantaginea.
Anthemis austriaca.
» aetnensis.
» aizoon.
» Biebersteini.
» Blancheana.
» carpathica.
» cinerea.
» cotula.
» montana.
» nobilis. (Camomille romaine.)
» rigescens.
» tenuifolia.
» tinctoria.
Anthericum ramosum. Petit lys blanc des rochers, très florifère.
Anthyllis montana.
» vulneraria.
Anticlea glauca.
Antirrhinum asarina.
» glutinosum.
» sempervirens.
Aphyllanthes monspeliensis.
Aplopappus Fremonti.
Aquilegia alpina.
» arctica.
» atrata.
» Bertoloni.
» burgeriana.
» californica.
» canadensis.
» chrysantha.
» cœrulea.
» flabellata. Blanc pur.
» glandulosa.
» lactiflora.
» longicalcarata.
» nigricans.
» Olympica.
» oxypetala.
» pyrenaica.
» skinneri. Fl. rouge et jaune très belle.
» stenopetala.
» Stuartii.
» truncata fl. rouge et jaune brillante.
» vulgaris.
(voir graines Plantes vivaces.)

Les ancolies sont d'excellentes pl. d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil mais préférant la mi-ombre et la fraîcheur.

Arabis albida.
» Allionii.
» alpestris.
» alpina.
» arenosa.
» bellidifolia.
» cœrulea.
» crispata.
» hirsuta.
» japonica.
» lucida.
» pumila.

» rosea.
» turrita.
Arctostaphylos alpina.
» Uva Ursi (Raisin d'Ours).
Arenaria Arduini.
» Balearica.
» biflora.
» cœspitosa.
» graminifolia.
» hispida.
» Kotschyana.
» leptoclados.
» montana.
» purpurascens.
» tetraquetra.
» verna.
Arisarum vulgare.
Armeria alpina.
» caespitosa.
» cephalotes.
» juncea.
» Labradorica.
» Laucheana.
» magellensis.
» plantaginea.
» setacea.
» wellwitchii.
Arnica chamissonis.
» foliosa.
» latifolia.
» longifolia.
» montana (véritable Arnica).
» sacchalinense.
Aronicum carpathicum.
» Clusii.
» glaciale.
» scorpioides.
Le beau soleil d'or des Alpes.
Artemisia absinthium (Absinthe).
» annua.
» austriaca.
» campestris.
» canadense.
» cœrulescens.
» desertorum.
» filifolia.
» frigida.
» glacialis.
Le Genépi des Piémontais.
» gracilis.
» granatensis.
» japonica.
» Ludoviciana.
» maritima.
» mexicana.
» mutellina (genépi du Valais).
» nevadensis.
» pontica.
» rupestris.
» spicata (le vrai genépi).
» stelleriana.
» tridentata.
» valesiaca.
» vulgaris.
Jolies Composées alpines aromatiques au feuill. finement divisé et généralement blanc d'argent. Soleil.

Asarum canadense.
» europæum.
» grandiflorum.
Ascyrum Crux Andrae.
» Stans.
Asperura odorata (Maitrank).
» humifusa.
» taurina.
Asphodelus albus (Asphodèle).
» pyrenaicus.
Aster alpinus.
» » Baldensis.
» » speciosus.
» » à fl. blanches.
» » » roses.
» » longipetiolatus.
» amellus.
» bessarabicus.
» Caucasicus.
» Curtisii.
» diplostephioides.
» himalaicus.
» pyreneus.
» sibiricus.
» Sikkimensis.
Astilbe japonica.
» rivularis.
Astragalus alopecuroides.
» aristatus.
» caryocarpus.
» cicer.
» depressus.
» drummondi.
» exscapus.
» hypoglittis.
» maximus.
» monspessulanus.
» Onobrychis.
» Parryi.
» pictus.
» prunifer.
» pugioniferus.
» purpureus.
» ramosus.
» reflexistipulus.
» Shortianus.
» sinicus.
Astrantia Biebersteinii.
» Caucasica.
» carniolica.
» gracilis.
» Helleborifolia.
» major (Etoile des Alpes).
Plante très montagnarde et des plus faciles à cultiver.
» minor.
» neglecta.
» pauciflora.
Athamante cretensis.
» Matthioli.
Atragene alpina.
Clématite bleue des Alpes.
» sibirica.
Atropa Belladona (Belladone).
» » à fruits jaunes.

Aubrietia antilibani.
» columnae.
» deltoidea.
» erubescens.
» Eyrii.
» græca.
» Hendersonni.

Petites Crucifères vivaces formant des tapis couverts de fl. d'un lilas plus ou moins vif suivant les esp.

Avena elatior.
» fatua.
» flavescens.
Azalea procumbens.
Ballota spinosa.
Bartsia alpina.
Bellidiastrum Michelli.
Bellis annua.
» cærulescens.
» perennis (Pâquerette).
Bellium bellioides.
» crassifolium.
Berteroa incana.
Beta trigyna.
Betonica alopecuros.
» grandiflora.
» hirsuta.
» incana.
» macrostachya.
» officinalis.
» » alba.
» stricta.
Biscutella lævigata.
Boykinia aconitifolia.
» elata.
» rotundifolia.
Brassica Richeri.
Braya alpina.
» pinnatifida.
Briza media.
» » lutescens.
Bromus Schraderi.
» squarrosus.
Bryonia dioica (pl. grimpante à fruits roug.).
Bulbocodium vernum.
Buphtalmum grandiflorum.
» salicifolium.
» speciosum.
» speciosissimum (récoltée dans les Alpes bergamasques).
Bupleurum longifolium.
» falcatum.
» fruticosum.
» ranunculoides.
Butomus umbellatus (Aquatique).
Caccinia glauca.
Calandrinia umbellata.
Calla palustris (aquatique).
Callitriche stagnalis.
Caltha palustris.
» radicans.
Campanula abietina.
» alliariæfolia.
» Allionii.
» alpina.
» barbata.
» » à fl. blanches.
» Baumgarteni.
» betonicæfolia.
» bononiensis.
» cæspitosa.
» carnica.
» carpathica.
» » à fl. blanches.
» » var. compacta.
» caucasica.
» cenisia.
» cervicaria.
» collina.
» cymbalaria.
» dahurica.
» dasycarpa.
» elatines.
» elatinoides.
» eryocarpa.
» excisa.
» fragilis (non rustique à Genève).
» glomerata.
» » à fl. blanches.
» Hostii.
» lactiflora.
» lamiifolia.
» latifolia.
» » à fl. blanches.
» lingulata.
» linifolia.
» macrorhiza (des rochers du Midi).
» mirabilis.
» nobilis.
» patula.
» pelviformis (Hort., non Lam.).
» persicifolia.
» punctata.
» pusilla.
» Raineri (vrai).
» » var.
» rhomboidalis.
» rotundifolia.
» Sarmatica.
» Saxifraga.
» Scheuchzeri.
» sibirica.
» speciosa.
» spicata.
» Steveni.
» subpyrenaica.
» thyrsoidæa.
» trichopoda.
» turbinata.
» » à fl. blanches.
» tyroliensis.
» urticifolia.
» Valdensis.
» Vanneri.
» velutina.
» Zoyzii.

Les Camp. sont faciles à élever par semis. Les espèces les plus faciles, les plus florifères et les plus jolies sont : Alliariæfolia, carpathica, eryocarpa, lactiflora, persicifolia, pusilla, sarmatica et turbinata. Les alliariæf. et nobilis sont à fl. blanches, thyrsoidæa à fl. jaunes et les autres à fl. lilas plus ou moins foncé, sauf leurs var. à fl. blanches. Toutes

fleurissent dans l'éte, à partir de la fin de mai et sont excellentes pour les rocailles ou la platebande.

Cardamine alpina.
» chenopodifolia.
» macrophylla.
» resedifolia.
Carduus defloratus.
» nutans.
» Personata.
Carex bicolor.
» maxima.
» nigra.
Carlina acanthifolia.
» acaulis.

Ce sont les superbes chardons d'argent qui, l'automne, animent les pentes de nos monts, où ils forment des touff. naines d'une grande beauté.

Cathcarthia villosa.
Centaurea alpina.
» axillaris.
» dealbata.
» depressa.
» Lugdunensis.
» montana.
» » à fl. blanches.
» nervosa.
» orientalis (à fl. jaunes).
» Phrygia.
» praealta.
» Ruthenica (à fl. jaune citron).
» rutifolia.
» spinulosa.
» uniflora.
Centranthus angustifolius.
» ruber. (Valériane rouge des mers).
Cephalaria alpina.
» radiata.
» tatarica.
» transylvanica.

Grandes scabieuses jaunes aux formes architecturales.

Cerastium alpinum.
» Biebersteini.
» chloræfolium.
» frigidum.
» glaciale.
» glandulosum.
» illyricum.
» lanatum.
» pennsylvanicum.
» tomentosum.
» villosum.
» vulgatum.

Ce sont de petites pl. traînantes aux innombrables fl. blanches.

Cerintne alpina.
Chaerophyllum villosum.
Chamæmelon caucasicum.
» oreades.
Cheiranthus alpinus.
Chelidonium Franchetianum.
Chenopodium Bonus Henricus.
Chicorium Intybus.
» » à fl. blanches.
Chionodoxa Alleni.
» cretensis.
» Luciliæ.
Chrysanthemum alpinum.
» caucasicum.
» cinerariæfolium.
» lacustre.
» maximum.
» montanum.
» Nipponicum.
» uliginosum.
Chrysopsis Bolanderi.
» foliosa.
» Rutteri.
» villosa.
Chrysoplenium alternifolium.
Cimicifuga fœtida.
» americana.
» racemosa.
Cineraria aurantiaca.
» campestris.
Circaea Lutetiana (pl. d'ombre).
Cirsium Eryophorum.
» Erysithales.
» ferox.
» heretophyllum.
» monspessulanus.
» Semenowi.
» spinosissimum.
» Wallichii.
Claytonia lanceolata.
» perfoliata.
Clematis recta.
Cnicus monspessulanus.
» involucratus.
» Wallichii.
Cochlearia Danica.
» officinalis.
Codonoptisovata.
Colchicum autumnale.
» variegatum.
Comarum palustre.
Convallaria majalis (Muguet).
Coris monspeliensis.
Cornus canadensis.
Coronilla Emerus.
» glauca.
» montana.
» valentina.
» varia.

La jolie coronille lilas et violet.

Corrigiola telephiifolia.
Cortusa Mathioli.
» » grandiflora.
» pubens.
Corydalis glauca.
» lutea.

Très propre à garnir les murailles où il fleurit constamment.

» nobilis.
» ochroleuca.
» ophiocarpa.
» sempervirens.
Cotyledon (Umbilicus) chrysanthus.
» ciliolatus.
» globulariæfolius.
» oppositifolius.
» platyphyllus.
» spinosus.

Crassula rubens.
Crepis aurea.
» blattarioides.
» incarnata.
» jubata.
» montana.
» pygmæa.
Crocus vernus.
Crucianella stylosa (fl. roses tr. abondantes).
Crythmum maritimum.
Cucubalus bacciferus.
Cyclamen europæum.
» hederæfolium.
Cynoglossum officinale.
Daphne alpina.
» cneorum.
» Laureola.
» Mazereum.
» » var. alpinum.
» striata.
Delphinium Cachemirianum.
» caucasicum.
» elatum.
» fomosum.
» grandiflorum.
» tirolense.
» triste.
» Zalil (à fl. jaunes).
Dentaria bulbifera.
» digitata.
» pinnata.
» poliphylla.
Dianthus acaulis.
» alpinus.
» alpestris.
» ambiguus.
» arenarius.
» aridus.
» armeria.
» atrococcineus.
» atrorubens.
» bicolor.
» cæsius.
» campestris.
» capitatus.
» carthusianorum.
» » var. multibracteatus.
» caryophyllus.
» ciliatus.
» controversus.
» corsicus.
» cruentus.
» deltoïdes.
» » albus.
» Falconeri.
» fragrans.
» giganteiformis.
» glacialis.
» glaucus.
» gracilis.
» heptaneurus.
» Holzeri.
» hispanicus.
» monspessulanus.
» neglectus.
» nitidus.
» Pancicii.
» pallens.
» pelviformis.
» petræus.
» Plumarius.

L'une des meilleures pl. à bordures et aussi l'une de celles qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

» Pontederæ.
» pubescens.
» Requieni.
» Scheuchzeri.
» Seguieri.
» speciosus.
» spiculifolius.
» squarrosus.
» superbus.
» » var. nanus.
» sylvestris.
» » à fl. blanches.
» tener.
» tenuifolius.
» versicolor.
» viscidus.
» wimmeri.

Les œillets, surtout dans le groupe des Plumarius, squarrosus, etc., sont excellents pour garnir les lieux arides et ensoleillés ; ils se contentent de peu et donnent avec abondance de délicieuses fl. odorantes. Tous s'élèvent facilement de semis.

Digitalis ferruginea.
» gigantea.
» grandiflora.
» lævigata.
» lanata.
» lutea.
» purpurea.
» » à fl. blanches.
» sibirica.
» Thapsi.

Ce sont des pl. solides et à flor. prolongée.

Dioscoræa caucasica.
» pyrenaica.
Dipsacus asper.
» ferox.
Dodecatheon giganteum.
» integrifolium.
» Mædia.
» » v. pauciflorum.
Doronicum austriacum.
» caucasicum.
» Columnæ.
» Pardalianches.
Dorycnium herbaceum.
» suffruticosum.
Draba aizoides.
» altaica.
» arabisans.
» armata.
» borealis.
» brunifolia.
» carinthiaca.
» chamæjasme.
» corsica.

» Dedeana.
» dychranioides.
» Fladnizensis.
» frigida.
» glacialis.
» Haynaldi.
» hispanica.
» incana.
» Kotschyi.
» lactea.
» Laponica.
» lasiocarpa.
» magelense.
» nivalis.
» olympica.
» oxycarpa.
» pyrenaica (Petrocallis).
» repens.
» rupestris.
» Scandinavica.
» Thomasii.
» tomentosa.
» tridentata.
» Wahlenbergi.
» Zahlbruckneri.
Dracocephalum austriacum.
» altaiense.
» argunense.
» grandiflorum.
» integrifolium.
» japonicum.
» Moldavicum.
» nutans.
» peregrinum.
» Ruprechti.
» Ruyschianum.
» » album.
» stramineum.
» thymifolium.
Dryas Drummondi.
» lanata.
» octopetala.
L'une des plus gracieuses pl. tapissantes pour rochers; grandes fl. blanches; graines lèvent bien.
Drypis spinosa.
Echium petræum.
Edelweiss (voir *Gnaphalium*).
Edrayanthus dalmaticus (*Hedraeanthus*).
» graminifolius.
Empetrum nigrum.
Endressia pyrenaica.
Ephedra altissima.
» distachya.
» monostachya.
» viridis.
Epilobium abyssinicum (fl. d'un carmin vif).
» alpinum.
» angustifolium.
» » à fl. blanches.
» Fleischeri.
» frigidum.
» japonicum.
» linnaeoides.
» nummulariaefolium.
» rosmarinifolium.
» sp. Nov. Zelandiae.
Epimedium colchicum.
Epipactis palustris.
Eranthis cilicica.
» yemalis.
Erica carnea.
» tetralix.
Erigeron alpinus.
» aurantiacus.
» caespitosus.
» caucasicus.
» compositus.
» Coulteri.
» erythrocephalus.
» flagellaris.
» glabellus.
» glaucus.
» Hartwegi.
» leiomerus.
» multiradiatus.
» Philadelphicus.
» pulchellus.
» salsuginosus.
» speciosus.
» umbellatus.
» uniflorus.
» Villarsii.
Erinus alpinus.
» » à fl. blanches.
» hirsutus.
» hispanicus.
Très jolies petites pl. à semer dans les vieux murs ou les rochers au soleil.
Eriogonum flavum.
» umbellatum.
Eriophorum angustifolium.
» latifolium.
» Scheuchzeri.
Eriophyllum caespitosum.
» confertiflorum.
Eritrichium nanum.
Erodium cheilantifolium.
» glandulosum.
» hymenodes.
» macrophyllum.
» Manescavi.
L'une des meilleures pl. de roc. fleurissant tout l'été et l'automne. Grandes et belles fl. carmin vif.
» pelargoniifolium.
Erpetion reniforme.
Eryngium alpinum.
Le vrai chardon bleu des Alpes; c'est l'une des plus belles pl. à cultiver dans les jardins et l'une de celles dont la culture est la plus facile. On vend la plupart du temps, sous ce nom, le vulgaire Eryngium d'Afrique.
» amethystinum.
» Bourgati. (Le Chardon bleu des Pyrénées.)
» cæruleum.
» campestre.
» creticum.
» giganteum.
» Rottenbergi.
» Vaseyi.
Erysimum Allionii.
» Helveticum.

» Kotschyanum.
» ochroleucum.
» Petrowskianum.
» pulchellum.
Très jolie pl. rampante, à fl. jaune vif; floraison prolongée; cult. facile.
» purpureum.
» Wittmanni.
Erythræa centaurœa.
» chloodes.
» littoralis.
» ramosissima.
Erythonium Dens Canis (Dent de Chien).
» sibiricum.
Euphorbia Gerardiana.
» Lathyris.
» Myrsinites.
Euphrasia lutea.
» minima.
» montana.
» officinalis.
Falcaria latifolia.
» scioides.
Farsetia clypeata.
» eryocarpa.
» lunarioides.
Festuca amethystina.
» alpina.
» crinum-Ursi.
» cunninghami.
» duriuscula.
» elegans.
» gigantea.
» glauca.
» Halleri.
» montana.
» pulchella.
» spadicea.
» valesiaca.
» violacea.
Petits gazons des montagnes à feuillage fin.
Fragaria indica.
Francoa appendiculata.
» racemosa.
» sonchifolia.
Frankenia lævis.
Fritillaria Meleagris.
» » à fl. blanches.
» acmopetala.
» pyrenaica.
» Stracheyi.
Galanthus nivalis.
Galium rotundifolium.
Gaultheria Shallon.
Gaya simplex.
Gentiana acaulis.
L'une de meilleures pl. des Alpes; germination lente mais sûre.
» alba (d'Amérique).
» alpina.
» amarella (annuelle).
» Andrewsi (d'Amérique).
» angulosa (annuelle).
» angustifolia.
» asclepiadea.
» » à fl. blanches.
» bavarica.
» Bigelowi (d'Amérique).
» brachyphilla.
» bracteosa.
» brevidens.
» Burseri.
» campestris (annuelle).
» Charpentieri.
» Clusii.
» cruciata.
» decumbens.
» Elwesii.
» Favrati (hybride des g. bavarica et verna).
» Fetisowii.
» frigida.
» germanica (annuelle).
» imbricata.
» involucrata (annuelle).
» Kesselringii.
» Kochiana.
» lutea.
Bonne pl. aux formes architecturales, à la hampe garnie de fl. jaunes, aux larges et belles f. nervées; fait un bel effet dans les rocailles ou isolée dans le gazon.
» macrophylla.
» Moorcroftiana.
» nivalis (annuelle).
» Olivieri.
» pannonica.
» Parryi (d'Amérique).
» phlogifolia.
» Pneumonanthe.
» Przewaldsky.
» punctata.
» purpurea.
» pyrenaica.
» recurvata.
» Rocheliana.
» Rostani.
» Saponaria.
» septemfida.
» serrata.
» Sikkimensis.
» squarrosa.
» straminea.
» tenella (annuelle).
» Tibetica.
» utriculata (annuelle).
» verna.
» v. atrocœrulea.
» azurea.
» v. grandiflora.
» Walujevii.
Geranium aconitifolium (rivulare).
» albiflorum.
» argenteum.
» armenum.
» Bohemicum.
» cinereum.
» Donianum.
» Endressi.
» Fremonti.
» grandiflorum.

» Grevilleanum.
» gymnocaulon.
» Ibericum.
» macrorhizum.
» nepalense.
» nodosum.
» palustre.
» phaeum.
» platypetalum.
» polianthes.
» pratense.

Excellente plante pour rochers et plates-bandes fleurissant tout l'été.

» Richardsoni.
» Robertianum album.
» roseum.
» sanguineum.
» » à fl. blanches.
» sessiliflorum.
» striatum.
» sylvaticum.

Gerbera Kunzeana.
» nivea.

Geum Chilœnse (à fl. rouges).
» coccineum (à fl. vermillon).
» elatum.
» Heldreichii.
» heterocarpum.
» hybridum.
» inclinatum.
» intermedium.
» japonicum.
» Magellanicum.
» montanum.
» pyrenaicum.
» reptans.
» rivale.
» Rhæticum.
» Sikkimensis.
» strictum.
» triflorum.
» tyrolense.

Gillenia trifoliata.
» stipulacea.

Globularia cordifolia.
» nana.
» nudicaulis.
» trychosantha.
» vulgaris.

Glossocomia clematidea.

Gnaphalium Leontopodium.
Voir *Leontopodium*.
» multiceps.
» supinum.
» sylvaticum.

Gutierrezia Euthamiæ.

Gymnadenia albida.
» conopea.

Gypsophila cerastioides.
» repens.
» Rokejeka.

Haberlea Rhodopensis.

Hacquetia Epipactis.

Haplocarpha Leichtlini.

Hebenstreitia comosa.
» serratifolia.

Hedysarum boreale.
» denticulatum.
» multijugum.
» obscurum.

Helianthenum alpestre (jaune).
» amabile (rose).
» apennimum (blanc).
» aurantium (orangé).
» bicolor (jaune et rouge).
» canum (jaune).
» cruentum (rouge vif).
» Fumana (jaune).
» grandiflorum (jaune).
» lutescens (jaune pâle).
» mutabile (de plusieurs teintes).
» œlandicum (jaune).
» polyfolium (blanc).
» roseum (rose clair).
» sanguineum (rouge vif).
» sulfureum (soufre).
» tomentosum (à feuilles blanc., fl. jaun.).
» vulgare (jaune).

Ce sont des pl. à gracieux feuill. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant pendant presque toute l'année; culture très facile. Pl. naines et touffes, excell. pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement.

Helleborus fœtidus.
» niger (Rose de Noël).
» orientalis.
» viridis.

Helychrisum angustifolium.

Hepatica angulosa.

Heracleum alpinum.
» diversifolium.
» giganteum.
» lanatum.
» Mantegazzianum.

Les gr. de cet Heracleum nous ont été apportées du Caucase en 1892. C'est une pl. superbe, gigantesque, et dont la description dans le « Nuove Giornale botanico italiano, » vol. II, avril 1895, donne à peine une idée suffisante bien que l'auteur attribue au moins 10,000 fleurs à sa large ombelle que porte une hampe de 2 à 3 mètres de haut. C'est une bonne pl. viv., propre à isoler dans les pelouses, de cult. extrêmement facile et à forte odeur anisée; elle est tout à fait nouvelle.

» montanum.
» orientale.
» persicum.
» pyrenaicum.

Herniaria glabra.
» hirsuta.
» incana.
» pyrenaica.

Hesperis nivea.
» tristis.

Heuchera altissima.
» bracteata.
» rubifolia.
» sanguinea.

Délicieuse saxifragée des montagnes du Mexique, aux fl. roses vif et se succédant de mai en août.

Hieracium albidum.
» aurantiacum.
» Bornmülleri (d'Orient).
» lanatum.
» stoloniferum.

» villosum.
Hippocrepis comosa.
Homogyne alpina.
» discolor.
Horminum pyrenaicum.
Houstonia cœrulea.
Hugueninia tanacetifolia.
Hydrocotyle vulgaris.
Hydrophyllum virginicum.
Hypericum Androsæmum.
» Ascyron.
» aureum.
Très bel Hyp. américain aux innombrables fl. jaune brillant.
» calycinum.
» caucasicum.
» Coris.
» densiflorum.
» elatum.
» elegans.
» empetrifolium.
» erectum.
» densiflorum.
» Gebleri.
» japonicum.
» Kotschyanum.
» microphyllum.
» montanum.
» nepalense.
» nummulariaefolium.
» Orientale.
» patulum.
» perforatum. (Millepertuis.)
» polphyllum.
» pyramidatum.
» quadrangulum.
» repens.
» reptans.
» Rhodopeum.
» Richeri.
» Scouleri.
» tomentosum.
Hypochæris Helvetica.
» maculata.
Hyssopus officinalis.
Pl. très aromatique, à fl. bleu foncé.
» officinalis à fl. blanches.
» » à fl. rouges.
» sp. Asie Centrale.
Iberis Bernardiana.
» commutata.
» gibraltarica.
Belle et bonne pl. à fl. se succédant pendant une bonne partie de l'année.
» Jordani.
» jucunda.
» saxatilis.
» sempervirens.
L'une des meilleures pl. à rocailles et bordures; fl. blanc pur, de mai en juillet; effet éclatant.
» stylosa.
» Tenoreana.
Impatiens Noli Tangere.
Balsamine jaune des Alpes.
Imperatoria Ostruthium.
Inula ensifolia.
» glandulosa.
Sorte d'Arnica à très grandes fl. originaire du Caucase.
» Helenium.
Iris (voir pl. vivaces).
Isatis tinctoria.
Jasione Jankæ.
» montana.
Jeffersonia diphylla.
Juncellus nipponicus.
Juniperus (voir arbustes).
Kernera (saxatilis).
Lactuca perennis.
Lappa major.
Laserpitium gallicum.
» gaudinii.
» halleri.
» latifolium.
» peucedanoides.
» siler.
Grandes Ombellifères au feuillage ornemental.
Lasiagrostis Calamagrostis.
Lathyrus angustifolius.
» aureus.
» cirrhosus.
» heterophyllus.
» montanus.
» pyrenaicus.
» sylvestris.
Lavande (voir pl. vivaces).
Leontopodium alpinum (Edelweiss).
Semer dans sol léger et tenir plutôt sec; repiquer jeune et cultiver au soleil et dans sol calcaire. Diviser tous les deux ans.
» Himalayense.
» japonicum.
» sibiricum.
» Sikkimensis.
» tibeticum.
» transylvanicum.
Lepidium alpinum (Hudchinsia).
Leucojum æstivum.
» vernum.
Leuzea coniferæ.
Levistichum officinale.
Libanotis montana.
Ligularia macrophylla.
» sibirica.
» speciosa.
Ligusticum aromaticum.
» pyrenaicum.
Lilium bulbiferum.
» chalcedonicum.
» dahuricum.
» dalmaticum.
» Martagon (excellent pour les sous bois).
» » à fl. blanches.
» » Cattaniæ.
» pomponium.
» pyrenaicum.
» tenuifolium.
Linaria alpina.
» » à fl. roses.
» anticaria.
» cymbalaria.
» » à fl. blanches.

» dalmatica.
» genistifolia.
» hepaticaefolia.
» macedonica.
» origanifolia.
» pallida.
» Pancicii.
» petræa.
» pilosa.
» striata.
» tristis.
Lindelofia spectabilis.
Linnæa borealis.
Linum alpinum.
» austriacum.
» cartharcticum.
» flavum.
» maritimum.
» multiflorum.
» narbonense.
» perenne.
» » à fl. blanches.
» sibiricum.
» tenuifolium.
Les Linum alpinum, austriacum et sibiricum sont de charmantes esp. à fl. bleu d'azur, fleurissant très longtemps. Culture facile.
Lippia repens.
Lithospermum Gastoni.
» graminifolium.
» multiflorum.
» oleoides.
» petræum.
» purpureo-cœrulueum.
Lloydia serotina.
Lobelia camtschatica.
» erecta.
» tenuior.
Lonicera (voir arbustes alpins).
Lotus corniculatus.
Lunaria rediviva.
Luzula campestris.
» lutea.
» nivea.
» spadicea.
» spicata.
Ce sont d'excellentes graminées à planter sous bois, dans les lieux où les fl. ne réussissent pas; la nivea a des panaches argentés très gracieux. Excellente pl. à fl. carmin vif; facile.
Lychnis alpina.
» » à fl. blanches.
» flos Jovis. Fl. de Jupiter.
» » à fleurs blanches.
» flos cuculi.
» fulgens.
» Lagascæ.
» Laponica.
» nigrescens.
» Preslii.
» viscaria.
Jolie Caryophillée rose carmin vif, facile à élever de graines.
» viscaria à fl. blanches.
Lynosiris vulgaris.
Lysimachia ciliata.
» Ephemerum.
» punctata.
» vesticillata.
» vulgaris.
Lythrum Salicaria.
» speciosum.
» virgatum.
Malva alcea.
» crispa.
Mandragora officinalis.
Marrubium candidissimum.
Matthiola valesiaca.
Mayanthemum bifolium.
Meconopsis cambrica.
(Pavot jaune). Cette pl. est excellente pour les lieux frais et ombragés.
» cambrica à fl. orangé.
» » à fl. doubles.
» Nepalensis.
» paniculata.
» petiolata.
» racemosa.
» Wallichiana.
Melandrium diurnum (à fl. roses).
Melica altissima.
» californica.
» ciliata.
» nutans.
» uniflora.
Melissum Melissophyllum.
Mentha citriodora.
» japonica.
» piperita.
» Pulegium.
» tomentosa.
» viridis.
Menyanthes trifolia (trèfle d'eau).
Mertensia (voir pl. vivaces).
Meum athamanticum.
L'une des plus fines verdures qu'on puisse imaginer.
» Mutellinum.
Michauxia campanuloides.
» Tschihatcheffii.
Micromeria filiformis.
» græca.
» Juliana.
» rupestris.
Mimulus cupreus.
» luteus.
» nepalensis.
» primuloides.
» Tillingii.
Mitchella repens.
Mitella dyphilla.
Modiola geranioides.
» multifida.
Mœhringia muscosa.
» pendula.
» polygonoides.
Molospermum cicutarium.
Molucella spinosa.
Morine longifolia.
» betonicaefolia.
» persica.
Mulgedium alpinum.
» Bourgaei.
» plumieri.

» sibiricum.
» tataricum.
Myosotis alpestris (fl. bleu pur).
» » à fl. blanches.
» palustris, bleu d'azur.
» rupicola.
» Welwitchii.
Myrrhis odorata.
La Myrrhe, dont les racines sont fortement anisées.
Narcissus juncifolius.
» pseudo-narcissus.
Nardus stricta.
Nepeta Camphorata.
» Cataria.
» Nepetella.
» nuda.
» var. albiflora.
» parnassica.
Onobrychis montana.
» petræa.
Ononis fruticosa.
» natrix.
» rotundifolia.
Onosma Helvetica.
» stellulatum.
Onothera caespitosa.
» macrocarpa.
L'une des meilleures plantes de rocailles ; grandes fl. jaune clair, de juin en novembre.
» pumila.
» speciosa.
» taraxacifolia.
Opuntia (voir Cactées rustiques).
Ophiopogon Jaburan.
» Wallichianum.
Orobus canescens.
» lathyrioides.
» niger.
» tuberosus.
» vernus.
Ostrowskya magnifica.
Oxyria digyna.
» elatior.
Oxytropis Baïkalensis.
» campestris.
» fœtida.
» Halleri.
» Lapponica.
» montana.
» ochroleuca.
» pilosa.
» spicata.
» sulfurea.
Pæderota Ageria.
» chamædrifolia.
Pæonia (voir pl. vivaces).
Papaver alpinum.
» alpinum var. à fl. rouge vif, rouge cinabre, roses et jaunes.
Ces pavots alpins sont d'entre les plus florifères, les plus gracieuses et les meilleures des plant. de roc. Leurs fleurs très abondantes, affectent toutes les teintes.
» atlanticum.
Bonne pl. à fl. rouge brique, un peu envahissante et fleurissant de juin en hiver.
» caucasicum.
» croceum.
» » var. du Saïran-Nor.
» gariepinum.
» Heldreichii.
» nudicaule.
» » à fl. blanches.
» » » jaune vif.
» » » rouges.
» » » rouge cramoisi.
» » » roses.
» » » soufrées.
» » » striée jaune et rouge.
» nudicaule. Toutes teintes mélang.
La pap nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les pl. alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la mi-ombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver ; bon pour la fl. coupée.
» pilosum.
» pyrenaicum.
» radicatum.
» Rhæticum.
» Rhæas (coquelicot).
Papaver rupifragum.
» spicatum.
» strictum.
Paradisia liliago.
» liliastrum.
Lis de St-Bruno ; facile à élever.
Paracaryum angustifolium.
Paris quadrifolia.
Parnassia palustris.
» nubicola.
Paronychia argentea.
» Kapelæ.
» nivea.
» serpyllifolia.
Patrinia rupestris.
» scabiosæfolia.
» villosa.
Pedicularis atrorubens.
» Barrelieri.
» foliosa.
» rostrata.
» tuberosa.
» verticillata.
Peganum Harmala.
Peltaria alliacea.
Penthorum chinensis.
» sedoides.
Petalostemon candidus.
» olygophyllum.
» tenuifolius.
Petasites albus.
» japonicus.
» niveus.
Peucedanum alsaticum.
» austriacum.
Phaca alpina.
» astragalina.
» australis.
» frigida.
Phleum alpinum.
Phlox divaricata.
» Douglasi.
» nivalis.

Physalis alkekengi.
Physaria dydimocarpa.
Physochlaina orientalis.
Belle Solanée à fl. d'améthyte, apparaissant en février-mars. Cult. facile.
Phyteuma austriaca.
» betoniæfolium.
» canescens.
» carestiæ.
» Charmeli.
» comosum.
» hemisphæricum.
» Micheli.
» nigrum.
» limonifolium.
» orbiculare.
» Scheuchzeri.
» Scorzonerifolium.
» serratum.
» spicatum.
Picridium Anandrium.
Pimpinella magna rosea.
Pinus Cembra (Arole).
Pour autres Pins, voir graines d'arbres.
Pinguicula alpina.
» grandiflora.
» longifolia.
» Reuteri.
» vulgaris.
Plantago alpina.
» californica.
» hirtella.
» major atropurpurea.
» monantha.
» montana.
» Patagonica.
» sericea.
» uniflora.
Platycodon (voir pl. vivaces).
Pleurospermum austriacum.
Plumbago Larpentæ.
Poa alpina.
» cæsia.
» violacea.
Podophyllum Emodi.
» peltatum.
Polemonium boreale.
» cœruleum.
Pl. mellifère, éminemment propre à orner un jardin ; fl. bleues très odorantes et se succédant sur la pl. de juin et sept.
» confertum.
» dissectum.
» flavum.
» foliosissimum.
» gracile.
» grandiflorum.
» Hymalayense.
» humile.
» mellitum.
» molle.
» pauciflorum.
» reptans.
» Richardsoni.
» scopulinum.
» Tanguticum.
Les Polémoines sont d'admirables pl. viv., formant de jolies touff. d'une verd. fine et gaie, et portant de beaux panicules de fl. bleues, blanch. ou jaunes, odorantes.
Polygonatum biflorum.
» cyrrhifolium.
» giganteum.
» humile.
» multiflorum.
» Thunbergi.
» verticillatum.
» vulgare.
Polygonum affine.
» amplexicaule.
» Bistorta.
» Bistortioides.
» Blumei.
» Brunonis.
» campanulatum.
» capitatum.
» delicatum.
» Emodi.
» filiferum.
» lanuginosum.
» Maximowiczii.
» multiflorum.
» nepalense.
» pterocarpum.
» vacciniifolium.
» viviparum.
Potentilla abschasica.
» adjarica.
» alchemilloides.
» alpestris.
» apennina.
» argentea.
» arguta.
» argyrophylla. Fleur d'un rouge ardent.
» astrakanica.
» atrosanguinea.
Très belle plante à fl. d'un rouge vif foncé, à feuillage odorant.
» aurea.
» Baldensis.
» Bornmülleri.
» caulescens.
» chinensis.
» chrysantha.
Jolie fl. jaune clair.
» Clusiana.
» coriandrifolia.
» crinita.
» delphinensis.
» diandrum.
» Fenzlii.
» fragiformis.
Belle espèce à feuillage velouté, se bronzant à l'automne.
» frigida.
» fruticosa.
» fulgens.
» glandulosa.
» grandiflora.
» Hippiana.
Beau feuillage argenté se bronzant à l'automne.
» Hookeriana.
» hypoleuca.

» Kleiniana.
» Kurdica.
» montenegrina.
» Mooniana.
» multifida.
Pl. très rare des Alpes du Valais.
» Nepalensis.
Superbe esp. à fl. rose tendre veinées de carmin.
» nitida.
» nivalis.
» pedemontana.
» peduncularis.
» pulcherrima.
» pyrenaica.
» recta.
» rivalis.
» rupestris.
» rupestris grandiflora.
» ruthenica.
» Salesowiana.
» sibbaldi.
» tanacetifolia.
» Thurberi.
» tridentata.
» tuberosa.
» valesiaca.
» Visiani.
Poterium sanguisorba.
Prenanthes albus.
» purpurea.
» racemosa.
Primula acaulis.
» » var. bleu intense.
» algida.
» Arctotis.
» auricula (type).
» Balbisii.
» Bellunensis.
» Berninæ.
» Boveana.
» capitata (vrai).
» carniolica.
» carpathica.
» cashmeriana.
» ciliata.
» Clusiana.
» commutata.
» confinis.
» cortusoides (cult. fac. ; jolies fl. carmin).
» Cottia.
» denticulata.
» » var. à fl. blanches.
» discolor.
» elatior.
» farinosa.
» » var. à fl. blanches.
» Floerkeana.
» floribunda (non rustique chez nous).
» frondosa.
» Forbesi.
» gelida.
» glaucescens.
» glutinosa.
» hirsuta.
» integrifolia.
» involucrata.
» japonica.
L'une des plus robustes, les hampes florales portent plusieurs tiges de fl. du carmin le plus vif. Elle aime l'humidité.
» » à fl. blanches.
» latifolia.
» leucophylla.
» longiflora.
» macrocalyx.
» magellanica.
» marginata.
» megasæfolia.
» minima.
» mollis.
» obconica (non rustique chez nous).
» obtusifolia.
» officinalis.
Fl. jaune orangé vif, odorantes, esp. très propre à émailler les prés et les pelouses.
» Parryi.
» pedemontana.
» Poissoni.
» Portæ.
» Potenschlagiana.
» pubescens.
» Rhætica.
Bel hybride naturel des Alpes grisonnes.
» rosea.
Du rose le plus vif qui se puisse rêver.
» scottica.
» Sieboldi.
» Sikkimensis.
» spectabilis.
» variabilis (les belles var. anglaises).
» venusta.
» veris (les meilleures var. anglaises).
» verticillata.
» villosa.
» viscosa.
La jolie Primevère carmin des Alpes granitiques.
» Vochinensis.
» Warei.
» Wulfeniana.
Prunella laciniata.
» hispida.
» grandiflora.
» vulgaris.
Pterocephalus Parnassi.
Pulmonaria angustifolia.
» azurea.
» rubra.
Pyrethrum anserinæfolium.
» argenteum.
» densum.
» macrophyllum.
» niveum.
» parthenifolium.
» Tasso.
» tenuilobum.
» tenuisectum.
» Tschihatscheffii.
Ramonda pyrenaica.
Ranunculus aconitifolius.
Excellent pour lieux frais et ombragés.
» affinis.
» alpestris.

» amplexicaulis.
» anemonoides.
» cardiophyllus.
» carinthiacus.
» causasicus.
» crenatus.
» diffusus.
» glacialis.
» graminæus.
» Illyricus.
» japonicus.
» Lingua (aquat.).
» millæfoliatus.
» montanus.
» parnassifolius.
» platanifolius.
» pulchellus.
» pyrenæus.
» rutæfolius.
» Seguieri.
» Thora.
Reseda canescens.
» complicata.
» fruticulosa. (Reseda en arbre.)
» glauca.
Rhaponticum cinarioides.
» Heleniifolium.
» pulchrum.
» scariosum.
Rhazia orientalis.
Rhodiola linifolia.
» ovata.
» rubra.
» rosea.
» scopoli.
Rhododendron cameliæflorum.
» chamæcistus.
» cinnabarinum.
» ferrugineum (La Rose des Alpes).
» fulgens.
» hirsutum.
» » à fl. blanches.
» intermedium.
» Kamtschaticum.
» myrtifolium,
» setosum.
» Thompsoni.
» Wightii.
Ribes alpinum.
Rodgersia podophylla.
Rœmeria hybrida.
Romanzoffia Sitchensis.
Rotala lanuginosa.
Roripa pyrenaica.
Rosa alpina (Eglantine sans épines).
Rubus arcticus.
» saxatilis.
Ruellia ciliosa.
Rumex alpinus.
» nepalensis.
» occidentalis.
» venosus.
Ruta graveolens.
Sabbatia campestris.
Sagina Linnæi.
» maxima.
Salix reticulata.
» retusa.
» serpyllifolia.
Salvia acaulis.
» argentæ.
» austriaca.
» glutinosa (sauge à fl. jaunes).
» Horminum (bractées colorées).
» Hyans.
» japonica.
» Nipponica.
» pratensis.
» ringens.
» Sclarea.
» spathacea.
» sylvestris.
» verbenacea.
» verticillata.
Sambucus racemosa.
Le sureau corail.
Samolus floribundus.
» Valerandi.
Sanguinaria canadensis.
Sanguisorba canadensis.
» dodecandra.
Sanicula europea.
Santolina rosmarinifolia.
Saponaria bellidifolia.
» cæspitosa.
» glutinosa.
» lutea.
» officinalis.
» ocymoides.
» » v. splendens.
La sap. ocym. est l'une des meilleures des pl. de rocailles; elle croît au soleil, retombe gracieusement et se recouvre, en mai-juillet, de nombreuses fl. roses.
Saponaria Vaccaria (annuelle).
Sarothamnus scoparius.
Satureya montana.
» pygmæa.
Sauromatum guttatum.
Saussurea alpina.
» crassifolia.
» decurrens.
» depressa.
» discolor.
Saxifraga aconitifolia.
» aizoides.
» Aizoon.
» » var. à fl. roses.
» ajugæfolia.
» Allionii.
» altissima.
» anceps.
» androsacea.
» aretioides.
» aspera.
» atropurpurea.
» australis.
» biflora.
» Blavii.
» Boydei.
» bronchialis.

» bryoides.
» bulbifera.
» Burseriana.
» cæsia.
» cæspitosa.
» canaliculata.
» carinthiaca.
» carpathica.
» cartilaginea.
» cernua.
» circinata.
» cochlearis.
» coniferæ.
» controversa.
» cordigera.
» criphylla.
» corymbosa.
» Cotyledon.
» crassifolia.
» crustata.
» cultrata.
» cuneifolia.
» Curchilli.
» Cymbalaria (annuel, à fl. jaunes).
» decipiens.
» demissa.
» diapensioides.
» elatior.
» exerata.
» Facchini.
» flavescens.
» florulenta.
» Forbesi.
» Friedrich-Augusti.
» Gaudini.
» geranioides.
» Geum.
» Gibraltarica.
» glandulosa.
» granulata.
» Griscbachii.
» Heucherifolia.
» Hirculus.
» Hostei.
» Huetti (à fl. jaunes, annuel).
» hypnoides.
» integrifolia.
» irrigua.
» Kolenatiana.
» Kotschyi.
» lanceolata.
» lasiophylla.
» leucanthemifolia.
» linguæformis.
» lingulata.
» longifolia.
» luteo-viridis.
» marginata.
» media (calyciflora).
» muretti.
» mutata (fl. orangé vif).
» nervosa.
» nivalis.
» oppositifolia.
» palmata.
» patens.
» pectinata.
» pedatifida.
» pedemontana.
» peltata.
» pensylvanica.
» planifolia.
» pseudo-sancta.
» pubescens.
» punctata.
» repanda.
» retusa.
» rivularis.
» Rocheliana.
» rotundifolia.
» sancta.
» sarmentosa.
» scardica.
» serratifolia.
» sponhemica.
» squarrosa.
» stellaris.
» stenopetala.
» sturmiana.
» Taygetaya.
» tenella.
» tiroliensis.
» tricuspidata.
» trifurcata.
» trydactilytes.
» umbrosa (Désespoir du peintre).
» Valdensis.
» Vandelli.
» varians.
» virginica.
» wettsteinii.
» whitlawi.

Germent avec facilité, mais à cause de l'extrême ténuité de leurs graines, il faut soigner les semis et ne pas arroser trop fort. Il est bon de ne pas recouvrir les gr. et de semer à la surface du sol.

Scabiosa caucasica.
» » alba.
» graminifolia.
» japonica.
» lucida.
» » à fl. blanches.
» lyratifolia.
Schivereckia Bornmülleri.
» podolica.
Scilla autumnalis.
» campanulata.
» japonica.
» patula.
» sibirica.
Scopolia carniolica.
Scorzonera austriaca.
Scrophularia alata.
» hoppii.
» juratense.
» Marylandica.
» oldhami.
» pyrenaica.
» urticifolia.
Scutellaria alpina.
» » à fl. blanches.

La Scut. alp. est une excell. pl. traînante à fl. bleu-lilas et blanc chez le type, très robuste et florifère.

» Britoni.
» orientalis.
Sedum acre.
» aizoon.
» album.
» altissimum.
» anacampseros.
» annuum.
» asiaticum.
» atratum.
» carpathicum.
» cœruleum.
» dasyphyllum.
» Douglasi.
» elongatum.
» Ewersii.
» fabaria.
» glaucum.
» Hispanicum.
» himalayense.
» kamtschaticum.

Esp. très florif., à fl. jaune d'or.

» laconicum.
» lydium.
» maximowiczii.
» maximum.
» micranthum.
» middendorfii.
» olympicum.
» pallidum.
» populifolium.
» purpurescens.
» reflexum.
» Rhodiola (voir Rhodiola).
» rupestre.
» Sempervivum (vrai).
» sieboldi (type).
» spectabile.
» spurium.
» stenopetalum.
» stoloniferum.
» telephium.
» ternatum.
» trifidum.
» turkestanicum.
» villosum.
» wallichianum.
Selinum tenuifolium.
Sempervivum acuminatum.
» arachnoideum.
» arvernense.
» bourgeanum.
» caucasicum.
» ciliosum.
» comoli.
» delassoiei.
» flagelliforme.
» funkii.
» gaudini.
» heuffeli.
» mettenianum.
» montanum.
» pittonii.
» pomelii.
» robustum.
» Seguieri.
» tectorum.
» tenellum.
» webbianum.
» wulfenii.
Senecillis carpathica.
Senecio abrotanifolius (fl. orangé vif).
» acuminatus.
» adenostyloides.
» adonidifolius.
» ætnensis.
» alatus.
» alpinus.
» artemisiæfolius.
» aurantiacus.
» biebersteinii.
» campestris.
» carniolicus.
» cordatus (très florifère, grande esp. à fl. jaune brillante).
» coriaceus.
» Correvonianus.
» diversifolius.
» doria.
» doronicum.

C'est le beau « *Soleil d'or* » des Alpes, à capitules orangés ; pl. très brillante et aimant le soleil et la rocaille.

» Douglasi.
» farfaræfolius.
» incanus.
» jacquinianus.
» Krameri.
» Ledebouri.
» Ligularia.
» macrophyllus.
» mortoni.
» nebrodensis.
» nemorensis.
» nebrodensis.
» nemorensis.
» palmatus.
» procerus.
» pulcher.
» quinquælobus.
» Reisachii.
» retusus.
» sarracenicus.
» stenocephalus.
» subalpinus.
» tyrolense.
» Yakla.
Serratula coronata.
» Vulpii.
Seseli caespitosa.
» gummifer.
Sibbaldia cuneata.
» maxima.
» parviflora.
» procumbens.
Sidalcea candida.
» malvæflora.
Sideritis hyssopifolia.

Jolie Labiée naine et touffue à fl. jaune soufre.

» Libanotica.
Silene acaulis.
» alpestris.
» alpina.
» armeria (annuelle).
» asterias (fl. en capitules, d'un rouge ardent).
» biflora.
» bryoides.
» ciliata.
» correvoniana.
» fabaria.
» fimbriata.
» fruticulosa.
» Libanotica.
» Lydia.
» maritima.
» melandriformis.
» monachorum.
» multicaulis.
» nutans.
» odontopetala rubra.
» otites.
» petræa.
» pseudo-otites.
» pumilio.
» pusilla.
» quadridentata.
» quadrifida.
» reichenbachiana.
» rupestris.
» rupicola.
» saxifraga.
» schafta.
L'une des rares fl. d'automne; fl. d'un carmin vif; cult. facile.
» valesia.
» zawadsky.
Sissimbrium strictissimum.
Smilacina racemosa.
» stellata.
Sobolewskya clavata.
Solanum Dulcamara.
Soldanella alpina.
» minima.
» montana.
» pusilla.
» pyrolæfolia.
Solenanthus apenninus.
Solidago alpestris.
» lithospermifolia.
» nana.
» puberula.
» Riddeli.
» rigida.
» rigidiscula.
» serotina.
» spectabilis.
Specularia Speculum.
Spiræa Aruncus.
La superbe Reine des bois aux grands panicules blancs.
» filipendula.
» Ulmaria.
Stachys lanata.
» plumosa.
Stipa gigantea.
» pennata.
Stobæa radula.
Streptopus amplexifolius.
Swertia bimaculata.
» connata.
» cordata.
» Kurzii.
» longifolia.
» macrosperma.
» multicaulis.
» paniculata.
» perennis.
» punctata.
Sylibum marianum.
Symphiandra Hoffmanni.
Campanulacée à fl. blanches, très florif. et propre à garnir les lieux frais.
» pendula.
Symphitum asperrimum.
» officinale.
» tauricum.
Tamus communis.
Bonne pl. grimpante propr. aux lieux ombrag., aux sous-bois, etc., se garnissant de baies écarlates à l'aut.
Tanacetum Herderi.
Tanacetum vulgare.
Telekia speciosa.
Très belle Composée à grandes formes et à capitules orangés, fleurissant d'août en oct.
Telephium Imperati.
» orientale.
Tellima grandiflora.
Teucrium chamædrys.
» flavum.
» lucidum.
» montanum.
» polium.
» pyreneicum.
» Scorodonia.
Thalictrum aquilegifolium.
Le délicat Pigamon aux élégants panicules lilas.
» Baïkalense.
» cornuti.
» Delavayi.
» Fendleri.
» fœtidum.
» minus.
Jolie verdure fine et gracieuse.
» saxatile.
» trigynum.
Thesium alpinum.
Thlaspi Kotschyanum.
» Kowatzi.
» microstyla.
» rotundifolium.
» violascens.
Tiarella cordifolia (jolie pl. d'ombre).
Tofieldia calyculata.
» glacialis.
» japonica.
» nepalensis.
Tommasinia purpurascens.
» verticillaris.
Towsendia grandiflora.

» sericea.
Trientalis europea.
Délicieuse Primulacée qui recherche l'ombre.
Trifolium alpestre.
» alpinum.
» Badium.
» montanum.
» spadiceum.
Triglochin palustre.
Trigonotis peduncularis.
Trillium atropurpureum.
» cernuum.
» grandiflorum.
» pendulum.
» sessile.
Triosteum pinnatifidum.
Trochyscanthes nodiflorus.
Trollius altaicus.
» asiaticus.
» aurantiacus.
» caucasicus.
» europæus.
Le beau « Globe d'or » des rég. mont. qu'on élève et cultive facilement. Il fleurit abond. si on lui donne un sol sain et une situation un peu fraîche. On en fait aussi de merveilleux bords d'étangs ou ruisseaux.
» hybridus.
Tulipa Greigii.
» montana.
Tunica saxifraga.
Umbilicus semenovi (v. en outre Cotyledon).
Uniola latifolia.
Vaccinium Myrtillus.
» oxycoccos.
» pennsylvanicum.
» uliginosum.
» vitiosiæa.
Valeriana alliariæfolia.
» alpestris.
» celtica.
» edulis.
» exaltata.
» flaccidissima.
» globulariæfolia.
» montana.
» officinalis.
» Phu.
» pyrenaica.
» Saliunca.
» sambucifolia.
» saxatilis.
» septentrionalis.
» supina.
» tripteris.
Veratrum album.
Le Vératre est une belle pl. aux formes architectur. qui a grand air dans une campagne pittoresque et dans une rocaille.
» nigrum.
Verbascum Blattaria.
» Hænkei.
» montanum.
» Olympicum.
» Phœniceum.
» Thapsus.
Veronica Allionii.
» alpina.
» aphylla.
» Bachofenii.
» bellidioides.
» caucasica.
» Chamædrys.
» dentata.
» filifolia.
» fruticulosa.
» gentianoides.
» incana.
» multifida.
» orientalis.
» peduncularis.
» prostata (d'un bleu superbe).
» satureyoides.
» saxatilis.
L'une des meilleures pl. de rocailles ; aime le soleil.
» serpyllifolia.
» sibirica.
» spicata.
» » à fl. blanches.
» stenophylla.
» Teucrium.
» urticæfolia.
Vesicaria sinuata.
» utriculata.
à planter dans les fentes de rochers.
Vicia dumetorum.
» Orobus.
» tenuifolia.
Viola æthölica.
» adunca.
» alpestris.
» alsophylla.
» altaica.
» arenaria.
» Banatica.
» biflora.
» calcarata.
» » à fl. blanches.
» canadensis.
» canina.
» cenisia.
» cognata.
» cornuta.
» » à fl. blanches.
» » à fl. jaunes.
» declinata.
» delphinifolia.
» elatior.
» Jovi.
» lancifolia.
» latisepala.
» lutea.
» mumbyana.
» Nuttali.
» olympica.
» ovata.
» palmata.
» palustris.
» pedatifida.
» pinnata.
» pinnatifida.
» polychroma.

» prionantha.
» rothomagensis (vrai).
» Rydbergii.
» stagnina.
» sudetica.
» sulfurea.
» sylvestris.
» Tommasiniana.
» Zoyzii.
Vittadenia triloba.
Wulfenia carinthiaca.



Graines de plantes vivaces d'ornement.

Pour les plantes vivaces.

Les plantes vivaces, qui furent les premières fleurs que l'on introduisit dans les jardins, ont été refoulées à l'arrière-plan par les brillantes exotiques pour lesquelles on a dû construire des serres et des couches chaudes et qu'on a dû acclimater à force de frais et de soins. Abandonnées par le gros public, elles sont restées l'apanage des gens de goût et des amateurs de belles choses; les artistes, les littérateurs, les amis du Beau et du Vrai reviennent aux plantes vivaces avec une ferveur digne de remarque. Ce sont leurs fleurs qui envahissent l'atelier du peintre et le cabinet de l'homme de lettres. Et ce sont les plantes vivaces, ces bonnes filles des zones froides ou tempérées, enfants souvent des frimas et des monts, qui servent les dessins de l'architecte paysagiste de notre époque. On en a assez des mosaïcultures qui sont une aberration du bon goût et la négation de l'art; on ne veut plus de ces corbeilles multi ou unicolores, gros pâtés colorés qui offusquent la vue de celui qui voue un culte aux belles choses ou au naturel. On leur préfère l'élégante silhouette d'une plante herbacée vivace dont les fleurs solides et innombrables sont une précieuse ressource pour les bouquets ou l'arrangement des intérieurs.

Inondez vos salons et vos chambres de travail de ces flots colorés et parfumés; que les fleurs animent vos maisons et poétisent votre existence et que, chaque jour, leurs charmes discrets élèvent vos âmes et agrémentent votre existence.

Pour cela, plantez d'espèces vivaces vos plates-bandes et vos massifs; détruisez les corbeilles monstrueuses et animez vos pelouses en plantant, ici et là, des touffes d'Anémones, d'Asters, de Kniphophias, de Delphinium, de Rudbeckias, etc.; plantez partout de ces bonnes plantes vivaces qui ne demandent rien sinon qu'on coupe leurs tiges à l'automne et qu'on les laisse vivre en paix, donnant à foison fleurs et parfums sans rien exiger du jardinier.

Abronia fragrans.
Acanthus mollis.
» spinosus.
» spinosissimus.
Achillea ageratum.
» filipendula.
Mille-feuilles à fleurs jaunes.
Aconitum variegatum.
» » à fl. blanches.
Adenophora denticulata.
» liliifolia.
» Potanini.
» verticillata.
Agrostemma coronaria.
(Coquelourde, plante très florifère et solide, à nombreuses fleurs d'un carmin vif.)
Althæa ficifolia (fl. jaune soufre).
» rosea.
Rose trémière à fl. simples, var. à fl. blanches, jaunes, blanc crême, roses, rouges ou brunes, séparées ou mélangées.

Alyssum calyocarpum.
Alyssum saxatile (Corbeille d'or).
Amsonia elliptica.
» latifolia.
» salicifolia.
Anaphalis margaritacca (Immortelle blanche).
Anchusa Barrelieri.
» italica.
» officinalis.
» sempervirens.
Anemone coronaria.
» hortensis.
» japonica.
» sylvestris à grandes fleurs.
(Très belle esp. de cult. facile.)
Angelica officinalis.
Antirrhinum majus (Gueule de loup).
» var. atrosanguinea.
Apocynum venetum.
Aquilegia alba (Ancolie blanche).
» californica (rouge et jaune).
» » à fleurs blanches.
» canadensis.
» » nana.
Nombreuses fleurs d'un beau rouge cinabre.
» chrysantha.
Fleurs jaunes à très longs éperons.
» chrysantha bicolor.
» cœrulea.
» cœrulea lutea.
» flabellata nana.
Pl. japonaise naine à nombreuses fl. blanches ; très précoce.
» glandulosa.
» » bicolor.
» » cœrulea.
» » rosea.
» » violacea.
Charmantes variétés, très florifères.
Aquilegia Haylodgensis.
Très belles variétés anglaises à grandes fl multicolores.
» hybrida.
Var. à grandes fl. de teintes très variées et brillantes.
» jucunda.
» Jetschani, fl. rouge et jaune.
» vulgaris.
Les Ancolies sont excell. pour la garnit. des endroits frais, des sous-bois pour émailler les pelouses, pour plate-bandes ou rochers. Leur abondante floraison, l'élégance de leurs fl., leurs couleurs vives et variées, et surtout le fait qu'elles sont robustes et de cult. extrêmement simple les recommandent à tous. Leurs graines germent de suite.
Arabis albida (corbeille d'argent).
Aralia cachemiriana.
Archangelica officinalis.
Artemisia Dracunculus (Estragon).
» Gnaphalioides.
Armeria cephalotes alba.
» speciosa.
Arum italicum.
Asclepias Cornuti.
» Hallii.
» incarnata.
» purpurascens.
» speciosa.
» tuberosa.
Bonnes plantes vivaces florif. et solides.
Asparagus acutifolius.
» verticillatus.
Asphodelina cretica.
Asphodelus albus.
» cerasiferus.
» fistulosus.
» luteus.
» ramosus.
Les Asphodèles sont de précieuses pl. pour l'ornementation des jardins.
Aster adulterrinus.
» bessarabicus.
Très belle espèce à nombreuses fl. bleu et or.
» cassubicus.
» curtisii.
» eminens.
» ericoides.
» japonicus.
» laevis.
» leucanthemus.
» microcephalus.
» nanus.
» novi belgii.
» » » à fl. blanches.
» ptarmicoides.
» pumilius.
» puniceus.
» scaber.
» simplex.
» turbinellus.
Astilbe Lemoinei.
» Thunbergi.
Baptisia australis.
» exaltata.
» leucantha.
Bigelovia graveolens.
Blitum virgatum.
Bocconia (Macclaya) cordata.
» japonica.
» microcarpa.
Borago officinalis (Bourrache).
Botryanthus ruthenicus.
Bryonia dioica (grimpante).
Cacalia tuberosa.
» hastata.
» suaveolens.
Callimeris (Aster) incisa.
Callirhoe involucrata.
» pedata.
» verticillata.
Calystegia dahurica, liseron rose vivace.
Camassia esculenta.
» Cusickii.
Campanula Alliariæfolia.
Belle pl. à grandes fl. blanches, penchées, formes élégantes.
» carpathica.
(Excellente pour bordures et former des tapis.)
» » à fl. blanches.
» eryocarpa.
Très belle et grande esp. à grandes fl. bleu-violet.
» haylodgensis.
» lamiifolia.
Pl. de taille moyenne à grandes et nombreuses fl. blanches.

» latifolia.
» » à fl. blanches.
Excell. pl. à flor. prolongée.
» latifolia versicolor.
» latiloba.
Excell. pl. vivace à floraison prol. ; fl. bleu clair.
» macrantha.
Espèce à très grandes fleurs.
» macrostyla.
» Medium. (Camp. carillon; bisann.)
» nobilis.
» nobili-macrantha.
» patula.
» pelviformis (Hort.).
» persicæfolia.
» primulæfolia.
» punctata.
» pyramidalis.
Pl. excellente pour garnir les vieux murs, les grands rochers, les graviers, les pentes arides, au soleil. Elle fleurit de juillet-août en novembre et constitue une des meilleures pl. d'ornement dans les jardins alpins ou les plates-bandes. Culture facile.
Camp. pyramidalis à fl. blanches.
» rapunculoides.
» Rapunculus.
» sibirica.
» speculum (Specularia).
» strigosa.
» Trachelium.
» » à fl. blanches.
» turbinata.
Bonne espèce naine, florif.
» urticifolia.
» Van Houttei.
» villicaulis.
Caryopteris mastacanthus.
Catananche cærulea.
Cedronella triphylla.
Celsia cretica.
» pontica.
Centaurea Babylonica.
Très haute espèce fl. jaune orangé.
» macrocephala.
Bonne espèce à gros capitules jaunes.
» suaveolens.
Centranthus ruber.
C'est la Barbe de Jupiter ou Valériane rouge vif, l'une des plus recommandables pl. d'ornement. Fait admirablement dans les fentes des murailles.
» ruber à fl. blanches.
» » à fl. rouge très foncé.
Chamæpeuce diacantha.
Cheiranthus Cheiri.
Chelone barbata.
» » hybrida.
» obliqua.
» Torreyi.
Les chélones sont d'excellentes pl. vivaces aux fl. rouge vermillon ou carmin ou rose, etc., de culture facile et dont les graines germent avec facilité.
Chrysanthemum caucasicum.
» lacustre.
» maximum.
» nipponicum.
Clematis integrifolia.
» recta.
Convolvulus mauritanicus, fl. lilas.
Coreopsis auriculata.
» grandiflora.
» lanceolata.
» senifolia.
» trichosperma.
» tripteris.
» verticillata.
Excellentes pl. d'ornem, très florifères ; fl. grandes, d'un jaune vif, se succédant de juillet en novembre. Cult. facile.
Crambe cordifolia.
» aspera.
» maritima.
» pinnatifida.
» tatarica.
Cucurbita perennis.
Crucianella stylosa, très jolie pl. tapissante : fl. roses.
Datisca cannabina.
Datura Stramonium.
» Tatula.
Pl. annuelles à semer dans les décombres ou sur les terreaux pour les orner.
Delphinium altissimum.
» ajacis (pl. annuelle).
» azureum.
» » var. albidum.
» bicolor.
» californicum.
» consolida (annuelle).
» » de plusieurs couleurs.
» elatum (des Alpes).
» Formosum (esp. superbe d'un bleu intense).
» Geyeri.
» grandiflorum.
» » var. à fl. blanches.
» hybridum.
Mélanges des meilleures variétés.
» intermedium.
» nudicaule (rouge vermillon).
» occidentale.
» scapulorum.
» speciosum.
» Tatzuense.
» villosum.
» zalil (jaune soufre).
Les Dauphinelles ou pieds d'alouettes vivaces sont d'entre les meill. de nos pl. d'ornement. Cult. facile et flor. prolongée si l'on a soin de couper les tiges après la floraison.
Dianthus barbatus.
Dianthus plumarius.
Excellente pl. pour garnir les talus, les murs, les rochers, les lieux arides; fl. abondantes et très odor. se succédant tout l'été. Elle s'élève facilement de graines.
» » var. Cyclope.
Dicentra eximia.
Dictamnus albus.
» Fraxinella. (Burning Bush.)
Digitalis lutea.
» purpurea.
» purpurea alba.
Les Digitales sont de bonnes pl. à fl. nombreuses en grappes dressées; cult. facile.
Dipplostephium salicifolium.
Echinacea intermedia.
» purpurea.

Excellente pl. vivace, s'élevant de 60 à 80 cm. et produisant pendant cinq ou six mois de grandes marguerites d'un rouge vin foncé ; bonne p. les bouquets.

Echinops Ritro.

(Gros chardon bleu de forme sphérique.)

» sphœrocephalus.

Elymus arenarius.

(Graminée vivace à feuillage bleuâtre.)

Eremostachys laciniata.

» iberica.

Eremurus altaicus.

» Bungei.

» himalaicus.

» spectabilis.

» turkestanicus.

Erigeron speciosus.

Grand aster bleu vivace.

Eryngium alpinum.

La plus belle et la plus ornementale des pl. alpines.

» giganteum.

Pl. de teinte gris plomb.

» creticum.

Involucre, épis et tiges bleu foncé.

» olivieranum.

» planum.

Fl. involucres et tiges d'un bleu violacé : on la sèche pour bouquets d'hiver.

Tous ces Eryngium ont l'aspect de Chardons bleus, bien qu'ils appartiennent aux ombellifères. Ce sont d'excellentes pl. d'ornement, propres à garnir les lieux arides.

Eryngium Juccæfolium.

Eschscholzia aurantiaca.

Papavéracée bisannuelle et très florifère qui se sème naturellement dans les plates-bandes ou les graviers et fleurit toute l'année, même l'hiver quand il n'est pas très rigoureux.

Eupatorium ageratoides.

Bonne pl. viv. à fl. blanc pur ; florais. prolongée ; cult. facile.

» album.

» altissimum.

» aromaticum.

» chinense.

» grandiflorum.

» Kirilovi.

» maculatum.

» purpureum.

» striatum.

» verticillatum.

Grands ombelles de fl. blanc d'un violet pourpre. Cult. facile.

» violaceum.

Farsetia clypeata.

Ferula Asa fœtida.

» communis.

» glauca.

» Narthex.

» nodiflora.

» orientalis.

Feuillages très finement divisés et décoratifs.

Festuca Crinum-Ursi.

(Le meilleur gazon propre à résister aux sécheresses.)

Fritillaria Imperialis.

Funkia cœrulea.

» ovata.

» Sieboldi.

Belles pl. d'ornement cultivées souvent sous le nom d'Hémérocalles.

Gaillardia aurantiaca.

» grandiflora.

» » variétés mélangées.

» maxima.

Les Gaillardes sont d'excellentes plantes d'ornement, à grandes fleurs jaune et rouge, fleurissent abondamment tout l'été.

Galega officinalis.

» » à fl. blanches.

» orientalis.

» persica.

Solides Papilionacées à floraison prolongée.

Galtonia candicans.

Grande Jacynthe vivace à fl. blanc pur.

Gaura Lindheimeri.

Excellente pl. d'ornement qui fleurit pendant tout l'été.

Geranium pratense.

Bonne espèce très rustique et florifère.

Geum coccineum.

Superbe pl. à fl. d'un rouge vermillon.

» cocc. var. atrosanguineum.

» » var. à fl. doubles.

» Heldreichii.

Ces Benoîtes, à fl. rouge vif, sont de semis et cult. faciles, et réussissent bien dans les sols sains, fleurissent de mai en octobre.

Glaucium luteum.

» rubrum.

Grindelia cuneifolia.

» humilis.

» inuloides.

» patens.

Très belles composées à grands capitules jaune soufre : excellentes pl. d'ornement et bonnes pour bouquets.

Gutierrezzia Euthamiæ.

Excell. petite pl. arbuscule se couvrant, de juillet-octobre, de fl. jaune vif, solide.

Gypsophila paniculata.

» scorzoneræfolia.

Hablitzia tamnoides.

Hedysarum coronatum.

Heleniastrum puberulum.

Helenium autumnale.

» Bigelowi.

» commutatum.

» Hoopesii.

C'est l'une des plus brillantes, des plus florif. et des meilleures d'entre les pl. vivaces. Grands capitules couleur orange vif.

Helianthemum mélangés de toutes couleurs.

Excellentes pl. basses, très florif., dont nous avons une collection complète (voir p. 10). Il en est de toutes teintes et couleurs. Elles sont faciles à élever de gr. et très ornementales.

Helianthus californicus.

» maximilianus.

» pumilus.

» rigidus.

» strumosus.

Heliopsis lævis.

» scabra.

Helleborus colchicus. Rose de Noël à fl. cuivrée.

» niger (Rose de Noël).

Helleborus orientalis vars.

Ces Hellébores, à fl. blanches, roses, rouges ou cuivrées apparaissent dans les premiers jours de mars et sont précieuses dans un moment où le jardin n'a pas de fleurs.

Hemerocallis Middendorfiana.

» fulva.

Heracleum giganteum.

» Mantegazzianum.

» Wilhelmshii.
» villosum.
Les Her. sont des pl. d'ornement aux formes architecturales et propres à garnir les lieux sauvages et pittoresques. Ils aiment la fraîcheur et la mi-ombre.
Hesperis matronalis. (Girarde odorante.)
Heuchera sanguinea.
» » var. splendens.
Hisbiscus palustris.
» roseus.
» splendens.
Superbe pl. d'ornement aux très grandes fl. roses.
Humulus Lupulus (Houblon).
Hypericum calycinum.
Millepertuis vivace et rampant à beau feuillage persistant et grandes fleurs jaunes aux myriades d'étamines.
» Gebleri. Belle espèce très robuste.
Hyssopus officinalis.
» » à fl. blanches.
» » à fl. rouges.
Iberis Gibraltarica hybrida.
Très bonnes pl. à fl. lilas ou blanches, excellentes pour la décoration des rochers ou des vieux murs.
Impatiens granduligera.
Balsamine carmin de l'Himalaya.
Incarvillea Delavayi.
» Olgæ.
» variabilis.
L'Inc. Delavayi est l'une des meilleures acquisitions de l'horticulture depuis quelques années ; belle pl. à très grandes fl. roses ressemblant à des *Gloxinias*, nombreuses et bonnes pour bouquets; juin-août. Plante solide; soleil; vient facilement de graines
Inula glandulosa. L'une des meilleures pl. vivaces.
» Helenium.
C'est l'Aulnée des médecins; sa racine est le meilleur remède pour les maladies d'estomac. Comme telle elle se vend très cher sur le marché de Genève.
Ipomæa leptophylla.
» pandurata.
Beau liseron vivace très rare dans les cultures.
Iris albida.
» ensata.
» fœtidissima.
» germanica.
» lutescens.
» pseudo-acorus.
» pyrenaica.
» sibirica.
Jolie pl. aux nombreuses fl. bleu foncé.
» v. fl. alte cœrulea.
» v. à fl. blanches.
» spectabilis.
» versicolor.
» virginica.
Isatis tinctoria.
Lathyrus angustifolius.
» alatus.
» aureus.
» latifolius. (Pois à fl. vivace.)
» » à fl. blanches.
» sphæricus.
Lavandula spica.
» Stœkas.
» vera.
» » à fl. blanches.
La Lavande se cultive au soleil et au sec.

Lepachys columnaris.
» purpurea.
Leucojum æstivum.
» vernum (niveole).
Liatris punctata.
» pycnostachya.
» scariosa.
» spicata.
Lilium candidum.
Linum grandiflorum (annuel).
» perenne.
» » à fl. blanches.
» » à fl. roses.
Les Linum perenne sont de délicieuses pl. à floraison gracieuse et presque permanente ; cult. facile.
» sibiricum.
Lobelia cardinalis.
» fulgens.
» Gerardi.
» speciosa.
» syphilitica.
Lophantus anisatus.
Labiée à la forte odeur d'anis.
» rugosus.
Lunaria bienis.
» » à fl. blanches.
(Monnaie du Pape.)
Lychnis chalcedonica.
L'ancienne et toujours belle croix de Malte ; d'un rouge vermillon.
» fulgens.
Fl. grandes et brillantes ; culture facile ; belle pl. ornementale.
» grandiflora.
» Haageana. Fl. rose-saumon.
» Sibirica.
» Sieboldi.
» Viscaria.
» var. à fl. blanches.
» var. splendens.
Les Lychnis sont de bonnes pl. d'ornement très florifères. Ils s'élèvent avec facilité par semis et sont de culture très aisée.
Maclaya cordata.
» microcarpa.
Connues également sous le nom de Bocconia. ces pl. sont d'entre les meilleures pl. vivaces à feuillage ornemental. Elles font merveille, isolées dans les pelouses ou pour la décoration des jardins pittoresques.
Matthiola sinuata.
» tristis.
Mertensia ciliata.
Mertensia lanceolata.
» paniculata (sibirica).
» virginica.
Michauxia campanuloides.
Mimulus cardinalis.
Musc à grandes fl. écarlates ; très florifère.
Monarda dydima.
» dydima à fl. blanches.
» fistulosa (thé d'Oswego).
» Kalmiana.
» menthaefolia.
» purpurea.
Les Monardes sont d'excellentes pl. vivaces, odoriférantes, très rustiques et florifères; fleurs ornementales et bonnes pour les bouquets.
Morina Coulteriana.
» longiflora.

Belle pl. décorative à l'aspect d'acanthe, aux beaux épis de fl. roses, se succédant pendant tout l'été.

Mulgedium Bourgæi.
» macrophyllum.
Laitue vivace à grandes fl. bleues.
Nuphar luteum (Nénuphar jaune).
Nymphæa alba.
(Lis des étangs ou nénuphar.)
Obeliscaria columnaris.
» pinnata.
» pulcherrima.
Onopordon bracteatum.
Pl. superbe, épineuse, à fl. d'argent, à formes architecturales, propre à isoler dans les gazons.
Onothera biennis var. grandiflora.
» Fraseri.
Très belle esp. à fl. jaune vif, à tige rougeâtre et fleurissant de juillet en octobre.
» fruticosa major.
» macrocarpa.
Pl. basse et traînante, à très grandes fl. jaunes fleurissant 4 ou 5 mois durant.
» speciosa.
Belle pl. vivace à grandes fl. rose clair.
Les Onothères sont de cult. extrêmement facile.
Orobus niger. Pl. solide pour garnir les sous bois.
Pæonia albiflora.
» coralina.
» decora (romanica).
» Emodi.
» lobata.
» officinalis.
» peregrina.
» triternata.
» Wittmanniana.
Les Pivoines types sont de très belles pl. d'ornement. Leurs gr. germent toujours mais seulement au bout d'une année.
Papaver involucratum.
Enorme fl. d'un rouge éclatant.
» maximum.
Très belles fl. mesurant plus de 30 cent. de diamètre ; pétales d'un rouge sang très ardent : la plus décorative et la plus richement colorée des pl. vivaces.
» Orientale.
Très gros pavot rouge, pl. à grand effet ; de culture extrêmement facile ; lève bien des graines.
» var. hybrida.
» nudicaule (Pavot d'Islande).
» var. à fl. blanche, jaune, soufre, rouge, orange, etc., à fl. striées, à fl. simples ou doubles, séparées ou en mélange.
Le Pavot d'Islande est peut-être la meilleure des pl. vivaces, car la fl. en est gracieuse et très apparente et se conserve longtemps dans l'eau ; en outre la plante fleurit pendant une bonne partie de l'année, à l'ombre ou au soleil. Elle préfère les sols légers et pierreux aux sols argileux mais va partout assez bien. Elle s'élève avec facilité par semis.
» splendidissimum.
Très belle espèce à grandes fl. rouges.
Paracaryum cœlestinum.
Pardanthus sinensis.
Pentstemon acuminatus.
» albus.
» atropurpureus.
» campanulatus.
» carinatus.
» centrantifolius.
» cobœa.
» cœruleus.
» confertus.
» cordifolius.
» cyananthus.
» diffusus.
» digitalis.
» Eatoni.
» frutescens.
» glaber.
» » var. alpinus.
» » à fl. rouges.
» gracilis.
» Hartwegi.
» heterophyllus (d'un bleu superbe).
» humilis.
» Jeffrayanus.
C'est une excellente pl. à floraison très prolongée, bonne pour bouquets.
» lævigatus.
» Mackayanus.
Espèce très florifère.
» ovatus.
» perfiolatus.
» procerus.
» pubescens.
Fl. très nombreuses, de teinte opale, se succédant tout l'été.
» puniceus (rouge vermillon ardent).
» Richardsonni.
» rubricaulis.
» secundiflorus.
» speciosus.
» spectabilis.
» stenopetalus.
» virgatus.
» Watsoni.
» Wrightii.
Les Pentstemon sont de bonnes pl. vivaces de plates-bandes ou de rochers, qui fleurissent longtemps et sont très ornementales. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison ; leurs fl. sont d'entre les meilleures pour les bouquets.
Phlomis Samia.
Belle plante d'ornement à fl. jaune clair et orange.
» fruticosa.
» tuberosa.
Phlox acuminata.
» decussata.
» divaricata.
» fructicosa.
» maculata.
Phygelius capensis.
Physalis Alkekengi (Coqueret).
Excellente pl. à gros fruits baciformes et entourés d'une belle vésicule rouge brique vif, qu'on conserve pour les bouquets d'hiver.
» Franchetti.
Beaucoup plus grande et décorative que la précédente.
Physotegia speciosa alba.
» virginica.
Très belle pl. vivace à fl. lilas rose.
Phytolacca decandra.
Pl. géante à tiges carmin.
carmin.
Platycodon autumnale.
» grandiflorum.
» » à fl. blanches.
» » nanum.
» Mariesi.

» Mariesi major.
» » à fl. blanches.
Superbes Campanules à grandes fl. ornementales, fleurissant de juillet en automne, de culture facile et excellentes pour bouquets.
Polemonium cœruleum.
» » à fl. blanches.
» grandiflorum.
Les Pol. sont des pl. robustes et très florifères, des plus faciles à élever et à cult.; fl. nombr. odorantes et précieuses pour bouquets.
Polygonum amplexicaule.
» Baldschuanicum (grimpante).
» cuspidatum.
» molle.
» multiflorum (grimpante).
» orientale.
Pl. annuelle de grandes dimensions et à beaux épis d'un rose vif.
» Sieboldi.
» sphærostachium.
» virginianum.
Potentilla atropurpurea.
A fl. d'un rouge très foncé; belle pl. très florifère; culture facile.
» chrysantha (jaune d'ocre).
» Hortensis.
Les meilleures variétés horticoles.
» Nepalensis, à fl. rose vif.
Primula acaulis à fl. bleues.
» Auricula vars.
Les meilleures Auricules des jardins anglais.
» Japonica.
Excell. pl. très fl. et propre à garnir les lieux frais.
» obconica (non rustique).
» Poissoni.
» polyantha (Hort.).
Dans les meilleures var. anglaises.
Pycnanthemum lanceolatum.
Pyrethrum roseum.
Rheum Collinianum.
» Emodi.
» officinale.
» palmatum.
» » var. à fl. rouges.
» » var. purpureum.
Rhaponticum cynarioides.
Rodhea japonica.
Rosmarinus officinalis (Romarin).
Rudbeckia ampla.
» californica.
» flava.
» fulgida.
» hirta.
» intermedia.
» laciniata.
» pinnata.
» purpurea.
Très belle esp. à fl. rouge foncé, fleurissant de Juillet en octobre-novembre; fl. excellentes pour les bouquets.
» purpurea nana.
» speciosa.
Ce sont d'excellentes pl. viv., solides, très fl. et dont les capit. jaune avec centre noir ou rouge foncé font le plus grand effet. Très bonnes pour la fl. coupée et de longue conserv. dans l'eau.
Salpichroma rhomboidea.
Salvia argentea.
Belles feuill. velues, soyeuses; fl. blanc azuré.
» azurea.
Belle fl. d'un azur très pur.
» azurea var. grandiflora.
» japonica.
» mellifera.
» officinalis.
» » à fl. blanches.
» Sclarea (aromatique).
» ringens.
Silene Asterias (très belle esp.).
Silphium asteriscus.
» doronicæfolium.
» laciniatum.
» lanceolatum.
» perfoliatum.
» Terebinthinum.
Sisyrichium anceps.
» angustifolium.
Solidago canadensis.
» gracilis.
» missouriensis.
» spectabilis.
Spiræa aruncus (Reine des bois).
Stanleya pinnata.
Statice latifolia.
Excellente pl. viv. à larges panic. de fl. bleues qu'on peut conserver pour l'hiver: fl. à bouquets de premier ordre.
Statice Gmelini.
» coccinea.
» speciosa.
Tanacetum macrophyllum.
Pl. à grandes formes: énormes cap. de fl. blanches.
» vulgare.
Telekia speciosa.
Le Telekia est l'une des plus solides et des plus précieuses pl. viv. d'ornement; grand feuillage architect. et beaux capitules d'or, fortement aromatiques.
Thermopsis caroliniana.
» Fabacea.
» lanceolata.
» montana.
» rhombifolia.
Trycirtis hirta.
Verbascum Gnaphalodes (feuill. blanc et floconneux).
» Hænkii.
Molène à fl. rougeâtres.
» Lychnitis.
» Olympicum.
Pl. décorative très élevée, avec belles fl. grises, fl. jaunes nombreuses.
» phœniceum.
» » vars.
Charmantes Molènes à fl. violet foncé, blanches ou roses très florif.
» Thapsus.
Verbena venosa.
Vernonia altissima.
» novæboracensis.
Compos. à grandes panic. de fl. violet foncé.
Veronica crassifolia.
» grandis.
» longifolia.
» maritima.
» paniculata.
» sibirica.
» subsessilifolia.

» virginiana.
Vincetoxicum nigrum.
» sibiricum.
Yucca angustifolia.
» glauca.
Zauschneria californica.
Très belle pl. à fl. vermillon.
Zephyranthes candida.

Graines d'arbres, d'arbustes de rocailles et plantes grimpantes.

Abies canadensis.
» nigra.
» pungens (sapin bleu).
» sibirica.
» sitchensis.
» subalpina.
Akebia quinata.
Albizzia (Acacia) julibrissin.
Joli mimosa, à fl. roses, rustique chez nous.
Amelanchier alnifolia.
» canadensis.
» vulgaris.
Amorpha nana.
Ampelopsis Veitchii.
Petite vigne vierge japonaise.
Amygdalus nana.
Arbutus unedo.
Aronia melanocarpa.
Aucuba japonica.
» floribunda.
Buccharis halimifolia.
» salicifolia.
Berberis aristata.
» integerrima.
» repens.
» stenophylla.
» Thunbergiana.
» virescens.
» vulgaris.
Berchemia racemosa.
Betula carpathica.
» nana.
» pumila.
Budleya intermedia.
» japonica.
» Lindleyana.
» variabilis.
Bupleurum fruticosum.
Calophaca Wolgarica.
Calycanthus præcox.
Caragana altagana.
» microphylla.
Caryopteris mastacanthus.
Cassia Marylandica.
Ceanothus americanus.
» integerrimus.
Celastrus articulatus.
Cephalanthus occidentalis.
Cercis canadensis.
» siliquastrum (arbre de Judée).
» » à fl. blanches.
Chionanthus virginica.
Cistus albidus.
» ladaniferus.
» laurifolius.
» monspeliensis.
» salvifolius.
» villosus.
Les Cistes sont de charmants arbrisseaux méditerranéens qui se couvrent de fleurs d'églantines roses, carmin ou blanches et produisent un grand effet. Tous ne sont pas rustiques sous le climat de Genève ou Paris, mais ils le sont dans l'Ouest et en Angleterre.
Citrus triptera.
(Citronnier rustique, du Japon.)
Clematis flammula.
» Fremonti.
» » superba.
» fusca.
» glauca.
» graveolens.
Très curieuse Clématie grimpante portant des milliers de fleurs jaunes pendant tout l'été.
» ligustifolia.
» montana.
» paniculata.
» Pitcheri.
» recta.
» Stans.
» tubulosa.
» verticillaris.
» » columbiana.
» virginiana.
« Viticella.
L'ancienne petite Clématie violette.
» Vitalba.
C'est la Clématie sauvage des bois et des haies; elle fait admirablement dans nos jardins et se recommande comme pl. grimpante de grande valeur à cause de sa rusticité à toute épreuve, de sa croissance rapide qui égale presque celle de la Glycine et aussi par ses fleurs et ses graines qui sont hautement décoratives.
Clerodendron trychotomum.
Colutea arborescens.
» cruenta.
Corchorus capsularis.
Coriaria japonica.
» myrtifolia.
Coronilla Emerus.
Cotoneaster acutifolia.
» Davidiana (horizontalis).
C'est le meilleur des arbustes de rocailles; ses branches s'étalent sur le sol en larges ragettes ou pal-

mettes garnies de jolies feuilles luisantes et se couvrent littéralement de fl. roses, puis de baies rouge vif qui persistent l'hiver. La graine lève facilement.
» microphylla.
» nigra.
» pannosa.
Excellent arbuste, gracieux et gai, introduit dernièrement du Yun-Nan.
» tomentosa.
» thymifolia.
A très petit feuillage persistant, vert foncé luisant.
» vulgaris.
Cytisus albus.
» alpinus.
» austriacus.
» capitatus.
Excellent arbrisseau de 1 à 1 m. ½ qui se recouvre de fl. jaunes pendant une bonne partie de l'année.
» elegantus.
» elongatus.
» Friwaldskyanus.
» hirsutus.
» Laburnum.
» monspessulanus.
» nigricans.
» purpureus.
» radiatus.
» sessilifolius.
Dorycnium suffruticosum.
Eryobothria japonica.
Evonymus atropurpureus.
» europæus.
» Hamiltonianus.
» japonicus, v. radicans.
» latifolius.
Exochorda Alberti.
» grandiflora.
Genista anglica.
» austriaca.
» ferox.
» germanica.
» hispanica.
» juncea.
Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.
» pilosa.
» radiata.
» sagittalis.
» scorpius.
» sibirica.
» tinctoria.
Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles, au soleil. Floraison prolongée, pl. solides.
Halimodendron argenteum.
Hamamelis virginica.
Hedera chrysocarpa (lierre à fr. jaunes).
» colchica.
Hedysarum multijugum.
Heimia (Neillia) myrtifolia.
» salicifolia.
Hippophaë rhamnoides (Argousier).
» salicifolia.
Hovenia dulcis.
Idesia polycarpa.
Isomeris arborea.
Itea virginica.
Jamesia americana.
Jasminum fruticans.
» humile.
» officinale grandiflorum.
Juniperus communis.
» nana (Genevrier traînant des Alpes).
» prostata.
» Sabina (La Sabine des Alpes).
Kerrya japonica.
Larix europæa (Mélèze).
» leptolepis.
» sibirica.
Lespedeza bicolor.
» Buergeri.
Lonicera alpigena (Chèvrefeuille des Alpes).
» canescens.
» chrysantha (Ch. f. doré).
» cœrulea (Ch. f. alpin à fruits bleus).
» flava.
» Maacki.
» nigra. (Chèvref. des Alpes à fruits noirs.)
» pyrenaica (vrai).
» rupicola.
» Ruprechtiana.
Lycium barbarum.
» chinense.
Excellent arb, traînant, propre à garnir des rampes et pentes arides et sèches.
Maclura aurantiaca.
Myricaria germanica.
Ostrya carpinifolia.
Paliurus aculeatus.
Jolis arbust. épineux, à forme gracieuse et propres à former des haies.
Phylliræa angustifolia.
» latifolia.
» media.
Picea nigra. Sapin noir d'Amérique.
» pungens (P. Parrayana glauca).
C'est l'une des plus brillantes introductions de ces dernières années, une conifère au feuillage glauque et presque bleu, qui fait un contraste charmant dans le jardin ou le parc.
Pinus Cembro (Pin d'arole).
» montana.
» uncinata.
Polygonum Baldschuanicum.
Pl. grimpante turkestane de grande valeur décorative et très florifère.
Pyrus arbutifolia.
» nigra, feuillages rougissant à l'automne.
Rosa alpina.
» Banksiæ (Bandes à fl. jaunes simples).
» Fortunei.
» macrophylla.
» microcarpa.
» microphylla.
» pimpinellifolia.
» rubiginosa (Sweet bryar).
Rubus biflorus.
» deliciosus.
» laciniatus.
» leucodermis.
» odoratus.
» Xanthocarpus.
Ruscus aculeatus (Buis ardent).
» Hypophyllum.
» racemosus.
Salix calyculata.
» eriostachys.

Sambucus canadensis.
» Ebulus.
» glauca.
» pubescens.
» racemosa.
Sarothamnus scoparius.
Sorbus chamæmespilus.
» scandica.
Spartium junceum.
Ulex europaeus.
Vitis Coignetiæ.

Graines de Cactées rustiques (Résistant aux hivers du centre européen).

Echinocereus viridiflorus.
Mammillaria missouriensis.
» vivipara.
Opuntia arborescens.
» arenaria.
» arkansana.
» Camanchica.
» cymochila.
» fragilis.
» Greeni.
» hybrida.
» macrorhiza.
» mesacantha.
» missouriensis.
» phæacantha.
» polycantha.
» » albospina.
» » major.
» Raffinesquiana.
» vulgaris.

Les Cactées ci-dessus lèvent facilement de graines et sont rustiques à nos hivers. Il suffit de tenir les plantes au sec (recouvertes de planches inclinées) pendant la mauvaise saison. Elles fleurissent abondamment l'été si l'on a soin de les planter au grand soleil. En Allemagne on en cultive de grandes collections sans même les recouvrir de planches.

Graines reçues d'Amérique, d'Australie, du Liban, du Japon, des Balkans, du Caucase, de l'Himalaya, de Nouvelle-Zélande, des Pyrénées, de Sibérie, du Sikkim, etc.

Abronia fragrans.
Acanthoponax divaricatum.
» ricinifolium.
Acer Osakadsuki.
Achillea falcata.
» odorata.
Actinidia Kolomikta.
Aeschynome indica.
Aethionema creticum.
» cappadocica.
» sp. Arménie.
Ajuga Pseudo-Iva.
Ainsliaea aptera.
Aletes acaulis.
Aletris nepalensis.
» Sikkimensis.
Allium victorialis (du Sikkim).
Alyssum argenteum (de Chypre).
» obtusifolium.
» tetrastemon.
Anaphalis contorta.
» nubigena.
» triplinervis.
» yedoensis.
Anemone globosa.
» patens (d'Amérique).
» rivularis.
Anisodus luridus.
Anona triloba.
Antidesma bunius.
Antirrhinum siculum.
Aphananthe aspera.
Aplopappus Fremonti.
Aquilegia cœrulea.
» flabellata stellata.
» glandulosa.
» pyrenaica.
» truncata.
Arabis perfoliata.
» purpurea.
Aralia sacchalinensis.
» edulis.
» racemosa.
Arenaria leptoclados.

Argemone hispida.
» platyceras.
Arisæma Jacquemontii.
» tortuosum.
» Wallichiana.
Aristotelia Maqui.
Arnica alpina.
» latifolia.
» longifolia.
Artemisia canadensis.
» frigida.
» japonica.
» tridentata.
» vulgaris (du Sikkim).
Aster acuminatus.
» ascendens.
» amethystinus.
» azureus.
» canescens.
» Chapmanni.
» commutatus.
» Himalaicus.
» foliaceus.
» Fremonti.
» japonicus.
» lævis.
» multiflorus.
» Porteri.
» scaber.
» Sikkimensis.
» tataricus.
» trinervius var.
» holophyllus.
» undulatus.
Asteromea indica.
Astilbe japonica.
» Thunbergi.
Atriplex canescens.
» rosea.
Aubrietia Libanotica.
Aucuba Himalaica.
Audibertia polystachya.
Berberis repens.
» Sieboldi.
» Thunbergiana var.
» maximowiczii.
» umbellata.
Berchenia racemosa (du Japon).
Berkeya purpurea.
Bocconia cordata var.
» Japonica.
Boehmeria platyphilla.
Boisduvalia (Onothera) densiflora.
Bonjeannia hirsuta.
Bothryospermum tenellum.
Brassaiopsis mitis.
Brassica Mickawashima.
Bromus brizæformis.
» japonicus.
Budleya Colvillei.
Bumelia tenax.
Bupleurum falcatum var. nigrocarpum.
Calamagrostis littorea.
» pilosula var. scabra.
Calandrinia grandiflora.


Calceolaria chelidonioides.
» scabiosæfolia.
Callicarpa americana.
» japonica.
» purpurea.
Callitriche stagnalis.
Caltha sibirica.
Campanula colorata.
» libanotica.
» macrostyla.
» nobilis.
» speciosa.
» Vidali.
Cardamine glauca.
Carex alopecuroides.
» atrata (Sikkim).
» gibba.
» Kyotoensis.
» neurocarpa.
» picta.
» podogyna.
» setigera.
» transversa.
» uncinoides.
Carlemannia Griffithii.
Caryopteris divaricata.
» mastacanthus.
Cassia mimosoides.
» occidentalis.
Cathcarthia villosa.
Cedronella triphylla.
Celtis caucasica.
» occidentalis.
» sinensis.
Cephalotaxus drupacea (du Japon et du Sikkim).
Cerastium rectum.
» vulgatum (Sikkim).
Ceratonia siliqua.
Cercidiphyllum japonicum.
Cercocarpus parvifolius.
Chionanthus virginica.
Chorizanthe membranacea.
Cistus albidus.
» crispus.
» vaginatus.
Cladrastis Tashiroi.
Clintonia alpina.
Comandra pallida.
Cneorum tricoccum.
Codonopsis affinis.
Coluteocarpus reticulatus.
Commelina communis.
» obliqua.
» Sikkimensis.
» tuberosa.
Commersonia Fraseri.
Convolvulus althæoides.
» Libanoticus.
» luteolus-purpureus.
» mauritanicus.
» Soldanella.
Coriaria japonica.
» terminalis.
Cortia Lindleyi.

Corydalis chærophylla.
» filicina.
» incisa.
» meifolia.
» ophiocarpa.
» pallida.
» Scouleri.
Cotoneaster bacillaris.
» Davidiana.
» frigida.
» japonica.
» microphylla.
» » var. glacialis.
» nummularia.
» vulgaris.
Cremanthodium oblongatum.
» reniforme.
» Thomsoni.
Cupressus arizonica.
» macrocarpa.
» thuyoides.
Cydea peltata.
Cynoglossum micranthum.
» nervosum.
Cyperus amuricus.
» japonicus.
Dalbergia stipulacea.
Daphne Gnidium.
Daphniphyllum macropodum.
Deschampsia cæspitosa.
Desmodium japonicum.
» Laburnifolium.
» podocarpum.
» trychocanlon.
Deutzia corymbosa.
» Sieboldiana.
Dianthus Libanotis.
» polycladus diffusus.
» serotinus.
Dicentra scandens.
» thalictrifolia.
Dioscora caucasica.
» Nipponica.
» Tokora.
Dirca palustris.
Dobinea vulgaris.
Edgaria daarjeelingensis.
Elæagnus multiflora.
Elatostema sarculorum.
Eleutherococcus senticosus.
Elshotzia cristata.
Enkianthus himalaicus.
Ephedra fragilis.
» viridis.
Epilobium luteum.
» linnæoides.
» reticulatum.
» roseum (du Sikkim).
» sp. Nouvelle-Zélande.
» tetragonum (Himalaya).
Eriocaulon alpestre.
Eriogonum Campanulatum.
» flavum.
Eriophyllum cæspitosum.
Eriophyton Wallichianum.
Eupatorium Cannabinum, var. du Sikkim.
» japonicum.
» chinensis.
» Kirilowi.
Euphorbia Aleppica.
» Characias.
» Dendroides.
» officinalis.
» peploides.
» robusta.
» Sikkimensis.
» spinosa.
Euphrasia officinalis (de l'Himalaya).
Euonymus alatus.
» europæus (du Japon).
» japonicus, var. radicans.
» oxyphillus.
Eurotia lanata.
Euryangium Sumbul.
Euscaphys staphyloides.
Evodia fraximifolia.
Fagara ailanthoides.
Fatsia japonica.
Ferula communis.
Fremontia californica.
Fumaria major (Japon).
Gahnia radula.
Galium aparine (Sikkim).
Gamblea ciliata.
Gaultheria nummularioides.
» procumbens.
» Shallon.
» trichophylla.
Gaura coccinea.
Genista Nyssana.
Gilia aggregata.
» Chamissonis.
» pungens.
Gomphostemma parviflora.
Guldenstædtia himalaica.
Gymnostemma pedata.
Haloxylon Ammodendron.
» » à fl. blanches.
Hemiphragma heterophyllum.
Heptaropleurum impressum.
Heracleum diversifolium.
» Brunonis.
» candicans.
» humile.
» nepalense.
» sublineare.
Herbertia Platensis (espèce inédite).
Herpetospermum caudigerum.
Hesperis tristis.
Hibiscus mutabilis.
» Tilaceus, var. Hamabo.
Hippophaë salicifolia.
Holbœllia latifolia.
Hovenia dulcis.
Hydrangea Hortensia var. acuminata.
» paniculata.
» radiata.
» scandens.
» vestita.
Hypericum hyssopifolium.

» patulum.
Ilex Hookeri.
» insignis.
» integra.
» monticola.
Illycium anisatum.
Iris Clarkei.
» Bungei.
» ensata, var. chinensis.
» Kæmpferi.
» lævigata.
» sibirica, var. orientalis.
» sissirinchium.
Isachme australis.
Ischaemum antheropoides.
» Sieboldi.
Juncus chrysocarpus.
» decipiens.
» Grisebachii.
» Leschenaultii.
» pauciflorus.
» triglumis (du Sikkim).
Juniperus pseudo-Sabina.
» recurva (var. Sikkim).
Kadsura japonica.
Krynitzkia Jamesii.
» virgata.
Lactuca Dubyaea.
» denticulata.
» gracilliflora.
» hastata.
» macrantha.
Lathyrus Sibthorpi.
» splendens.
Laurentia tenella.
Ledum palustre.
Leea aspera.
» sambucina.
Leiophyllum buxifolium.
» prostratum.
Leptocodon gracilis.
Leycesteria formosa.
Lespedeza bicolor (l'un des meilleurs arbustes florifères).
» Burgeri.
» eriocarpa.
» virgata.
Liatris elegans.
» punctata.
» pycnostachia.
» scariosa.
Ligustum Regelianum.
» japonicum.
Lilium cordifolium.
» giganteum.
» Glehni.
» Grayi.
» japonicum.
» superbum.
» tigrinum.
Linaria Nyssema.
Liriope graminifolia.
Lithospermum angustifolium.
» longiflorum.
» multiflorum.
Litsaea sericea.
Lobelia erecta.
Lonicera angustifolia.
» japonica.
» tomentella.
Lubinia lubinioides.
Luculia gratissima.
Luffa acutangula.
Lycium chinensis.
» obovatum.
Lycopus luridus.
Lysimachia barystachys.
» Fortunei.
Macropodium nivale.
Mallotus japonicus.
Malva sylvestris (Sikkim).
» verticillata.
Maximowiczia amurensis.
Meconopsis bella.
» grandis.
» paniculata.
» simplicifolia.
Melia Azedarach.
» japonicus.
Meliosma dilleniæfolia.
Microglossa altescens.
Miscanthus condensatus.
» sacchariflorus.
» sinensis.
Michellia compressa.
Morina longifolia (de Sikkim).
» persica (des Balcans).
Nandina domestica (Chine).
» » (Japon).
Nepeta cilicica.
» cypria.
» lamiopsis.
Omphalodes Luciliæ.
Onobrychis cornuta (Liban).
Onosmidium carolinianum.
Onothera arguta.
» Howardi.
» nivea.
» pallida.
Orixa japonica.
Ornithogalum tenuifolium.
Osbeckia nepalensis.
» nutans.
» stellata.
Osmanthus aquifolius (Japon).
Pæderia tomentosa.
Paliurus aculeatus.
Panicum Crux Galli.
Paracaryum cœlestinum.
» heliocarpum.
» myosotidioides.
Paris poliphylla.
Parnassia Wightiania.
Patersonia longiscapa.
Penthapanax Leschenaultii.
Penthorum chinensis.
Phacelia californica.
» circinata.
» glandulosa.
» sericea.

» tanacetifolia.
Phellodendron Amurense.
Phlomis breviflora.
» chrysophylla.
» macrophylla.
» rigida.
» rotata.
» setigera.
Photinia arbutifolia.
Phyllanthus Andersonni.
» simplex.
Physalis lobata.
Phytolacca decandra.
» dioica.
» esculenta.
Picea Omorika.
Picrasma cassioides.
Picris hieracioides.
» Sprengeliana (Chypre).
Picrorhiza Kurrooa.
Pimpinella acronemæfolia.
» achilleifolia.
» diversifolia.
» Sikkimensis.
» Wallichii.
Piptanthus nepalensis.
Pittosporum floribundum (Sikkim).
Plagius ageratifolius.
Platycodon glaucum.
Plectranthus Cætsa.
» gerardianus.
» scrophularioides.
Pleurospermum angelicoides.
» Sikkimensis.
Podophyllum Emodi (Sikkim).
Pollya japonica.
Polygala arillata.
Polygonum amplexicaule.
» Baldschuanicum.
» multiflorum.
» villosum.
Potentilla ambigua.
» arguta.
» fruticosa var. arbuscula (de l'Himalaya).
» » var. achreata (Sikkim).
» fulgens.
» geranioides (Liban).
» Griffithii.
» leuconota.
» Libanotica.
» rivalis.
Pratia angulata.
Psiloria californica.
Psoralea macrostachya.
» monticola.
» tenuifolia.
Pueraria Thunbergiana.
Raphiolepis japonica.
Remusatia vivipara.
Reseda arborescens.
Rheum acuminatum.
» nobile.
Rhodocistus Bertholetianus.
Salix calyculata.
» eriostachya.
Salvia azurea.
» campanulata.
» japonica.
» nipponica.
» spathacea.
» verbenacea.
Sambucus adnata.
» australis.
» callicarpa.
» canadensis.
» glauca.
» pubens.
» pubescens.
» Sieboldi.
Rhyncothecum ellipticum.
» vestitum.
Rohdea japonica.
Roscœa purpurea.
» Sikkimensis.
Rubia munjista.
Rubus Andersoni.
» deliciosus.
» fraxinifolius.
» nutkanus.
Ruellia ciliosa.
Salvia campanulata.
» cypria.
Sambucus adnata.
» Sieboldiana.
Sanguisorba tenuifolia alba.
Sarcococca pruniformis.
Sarcopyramis nepalensis.
Sarracenia purpurea.
Sauromatum guttatum.
Saussurea candicans.
» hypoleuca.
» obvallata.
» uniflora.
Schizophragma hydrangeoides.
Scirpus Nipponicus.
Scopolia japonica.
Scrophularia hirta (Chypre).
Selliera radicans.
Smilacina amplexicaulis.
» pallida.
Smilax aspera.
» herbacea.
» hispida.
» laurifolia.
» mauritanica.
» rotundifolia.
» tamnoides.
» Walteri.
Solanum crassipatelum.
» pseudo malongena.
» verbascifolium.
Sophora flavescens.
» galegoides.
» tetraptera.
Sorbus trilobata.
Spigelia marylandica.
Spiræa bella.
» sorbifolia.
Sporolobus indicus.
Stanleya pinnata.

Stephananda Tanakæ.
Stuartia pentagyna.
Suæda altissima.
» fruticosa.
» glauca.
Taraxacum corniculatum.
» libanoticum.
» officinale album.
Teucrium Arduini.
» creticum.
» nivale.
Thalicrum adianthifolium.
» Chelidoni.
» elegans.
» Fendleri.
» foliosum.
» polygamum.
Thelesperma gracile.
Tournefortia elegans.
» heliotropioides.
Trachelospermum jasminoides.
Trachycarpus excelsa.
Trachydium obtususculum.
Trichosanthes cucumeroides.
Triphostagia glandulifera.
Tsuga Brunoniana.
Turpinia pomifera.
Tupistra Clarkei.
Umbilicus (Cotyledon) Libanoticus.
Vaccinium glauco-album.
Valeriana edulis.
» septentrionalis.
Vandelia pyxidara.
Verbascum cedreti.
» rigidum.
Verbena tenera.
Veronica amplexicaulis.
» angustifolia.
» Grevillea.
» himalayensis.
» japonica.
» Kirkii.
» parviflora.
» pinguæfolia.
» salicifolia.
» Traversi.
(La plupart proviennent de la Nouvelle-Zélande).
Vesicaria grandiflora.
» montana.
Vicia canescens.
» truncata.
Vincetoxicum canescens.
» rubrum.
Viola Sieheana.
Vitex trifoliata.
» unifoliata.
Vitis amurensis.
» cordifolia.
Vittadenia australis.
Wahlenbergia gracilis.
Wahlbergella affinis.
Wisteria pubescens.
» magnifica.
Xanthoceras sorbifolia.
Yucca angustifolia.
» glauca.
Zanthoxylum acanthopodium.
» ailanthoides.
» alatum.
» inerme.
» piperitum.
» planispinum.
» Schinifolium.
Zyziphus vulgaris.



Ouvrages de M. H. CORREVON
EN VENTE AU JARDIN ALPIN D'ACCLIMATATION

(*Les frais de port sont comptés en plus*)

Les plantes des Alpes

Genève 1884. Epuisé

Les Fougères rustiques

Ouvrage couronné par la Société d'Horticulture de Genève, la Société d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault, le Jury de l'Exposition internationale de Paris 1890, la Société régionale d'Horticulture de l'Ain, la Société d'Horticulture de Nancy, par des médailles d'or ou d'argent et les félicitations de plusieurs jurys. — **Prix : 5 fr.** (45 gravures).

Les Orchidées rustiques

Cet ouvrage a été couronné par plusieurs Jurys.

Ouvrage de 250 pages, illustré de 34 gravures. — **Prix : 4 fr.**

Flore coloriée de poche

A L'USAGE DES TOURISTES

dans les montagnes de la Suisse, de la Savoie, du Dauphiné et des Pyrénées.

Un volume de 160 pages de texte avec 188 figures coloriées, dans le texte même, représentant les plantes de montagnes les plus répandues. Ouvrage d'un format facile à mettre en poche, cartonnage souple avec coins arrondis.

Prix : 6 fr. 50.

Ouvrage très pratique qui a obtenu un grand succès dans le public alpiniste et touriste.

Les plantes alpines et de rocailles

Leur culture et leur acclimatation dans nos jardins.

Un volume relié toile, de 200 pages avec plusieurs illustrations.

Prix : 2 fr. 50.

Les Fougères de pleine terre les Prêles Lycopodes et Sélaginelles rustiques

Un volume relié toile, 140 p. avec illustr. — **Prix : 2 fr. 50.**

Genève. — Imprimerie Paul Richter, 10, rue des Voirons

Le Jardin de l'Herboriste

Nouvelle édition avec index très complet (110 gravures).

Propriétés et culture des simples et plantes officinales.

Prix : 3 fr. 50.

Par Monts et par Vaux

Un volume de 232 pages.

avec nombreuses illustrations de Mlle Adèle CORREVON

Prix : 5 francs.

Della cultura delle piante alpine nelle regioni secche e calde

Prezzo : 1 lira.

C'est une brochure de 12 pages que M. Correvon a publiée à l'usage des personnes qui habitent les pays tempérés (l'Italie ou le Midi) et qui veulent cultiver des plantes alpines. La culture de celles-ci dans le Sphagnum est le meilleur système à employer, et c'est pour le recommander et l'expliquer que l'on a publié ces pages en langue italienne.

Le même ouvrage en français :

Culture des plantes alpines dans le sphagnum pour les climats méridionaux et secs

Prix : 1 franc.